

۹۵/۱

زنانه امراض

اور

ان سے تحفظ

:- مصنف :-

ڈاکٹر محمد رفیع احمد

بی. ایچ. ایم. ایس (کلکتہ)

ڈاکٹر ابرار ظفر اقبال
ڈاکٹر اسماعیل علی

سابق سینر ہاؤس فیزیشن، کلکتہ ہومیوپیتھک میڈیکل کالج اینڈ ہسپتال،
سابق چیئرمین، ہومیوپیتھک لٹریچر ریسرچ کریکشن اینڈ اسٹینڈرڈائزیشن کمیٹی
جنرل سکریٹری نیشنل آکزیلیم سوسائٹی آف ہومیوپیتھس (نیش)

ناشر

بی۔ جین پبلشرز (پرائیویٹ) لمیٹڈ، نئی دہلی۔ 110055

پیش لفظ

زنانه امراض اور ان سے تحفظ : کے عنوان پر لکھی گئی یہ کتاب دور حاضرہ کی خواتین کے لئے ایک ایسی کتاب ہے جس کے مطالعے سے انہیں بڑی جانکاری حاصل ہوگی اور پھر وہ اپنی صحت کا محفوظ کرنے میں کامیاب رہیں گی کیوں کہ اس کتاب میں عورتوں کے ان امراض کو بیان کیا گیا ہے جو عام طور پر دیکھے جاتے ہیں اور جن سے ان کی صحت بری طرح متاثر ہوتی ہے۔ اس کی خاص وجہ یہ ہے کہ بیشتر عورتیں انہیں معمولی سمجھ کر یا پھر شرم کی بنا پر بروقت ان کا علاج نہیں کراتی ہیں۔ نتیجتاً مختلف قسم کی پیچیدگیاں ان کے جسم میں جنم لیتی ہیں جو ان کے مستقبل کو پریشان کن اور اذیت ناک بنا دیتی ہیں۔ اس کتاب کے پہلے حصے میں انہیں پہلوؤں پر روشنی ڈالی گئی ہے۔ خواتین کے علاوہ ہومیوپیتھی کے طلباء و طالبات اور ڈاکٹر حضرات بھی اس کے مطالعے سے اپنی معلومات میں اضافہ کر سکتے ہیں۔

کتاب کے دوسرے حصے میں زنانه امراض کے ہومیوپیتھی معالجات یعنی ان بیماریوں کی مریضوں میں عام طور پر استعمال کی جانے والی دواؤں کو یکے بعد دیگر علامتوں کے ساتھ بیان کی گئی ہیں جو عام طور پر تشخیص کی جاتی ہیں اور جوان کی شفا کا ذریعہ بنتی ہیں۔

کتاب کا یہ حصہ ہومیوپیتھی طلباء و طالبات کے علاوہ ڈاکٹر حضرات کے لئے بے حد مفید ہے۔

میں امید کرتا ہوں کہ اس کتاب کو پڑھنے کے بعد لوگ اپنی رائے اور اپنے مشورے سے مجھے نوازیں گے جسے میں بخوشی قبول کروں گا۔ عام لوگوں کے ذہن کو سامنے رکھ کر میں نے یہ کتاب نہایت ہی عام فہم اور آسان اردو میں لکھنے کی کوشش کی ہے۔

میں اپنے عزیز دوست محمد اشرف الدین کا بہت ممنون ہوں جنہوں نے میری اس تخلیق کو کامیاب بنانے میں میری کافی مدد کی۔ اس کے ساتھ ہی میں اپنے بڑے

بھائی محمد صفیر احمد کا بھی شکریہ ادا کرتا ہوں جن کی ہمت افزائی اور اعانت میرے لئے
بڑی اہمیت کی حامل ہے۔ اس کتاب کے ناٹر بی جین پبلشر (نئی دہلی) کا بھی بے حد
شکر گزار ہوں جنہوں نے یہ کتاب شائع کر کے میری اس کوشش کو کامیاب بنانے میں
بھرپور تعاون دیا اور میری کوششوں کو سراہا۔ اس کے علاوہ میں اس ادارے کے
ڈائریکٹر جناب کلپ جین کا خاص طور پر شکریہ ادا کئے بغیر نہیں رہ سکتا۔

محمد رفیع احمد

بی۔ ایچ۔ ایم۔ ایس

2-H-1-13 پوار بگان لین کلکتہ 70009

مغربی بنگال

فہرست مضامین

شمار	مضمون	صفحہ
	پہلا حصہ	

1- پہلا باب 13

میتار کی اور ڈسمیونیا

2- دوسرا باب 18

آمینوریا، ویکریس میٹروائشن اور حیض کا دب جانا

3- تیسرا باب 22

لیکوریا

4- چوتھا باب 26

مینور بیجا اور میٹورور بیجا

5- پانچواں باب 31

بچہ دانی میں ٹیو مریا مائیو فابروما یا پوٹرائن فابرائیڈ

6- چھٹا باب 35

اسقاط حمل اور خاندانی منصوبہ بندی

دوسرا حصہ

1- تکلیف دہ ماہواری کے ہومیو پیتھی معالجات 43

2- دبی ہوئی ماہواری کے ہومیو پیتھی معالجات 54

- 57 3- ماہواری کا نہ ہونا اور اس کے ہومیو پیتھی معالجات
- 4- عورتوں میں دھات گرنے کی بیماری
- 59 یا اختناق الرحم کے ہومیو پیتھی معالجات
- 64 5- حد سے زیادہ ماہواری کے ہومیو پیتھی معالجات
- 68 6- بچہ دانی سے خون کا بہنا اور ہومیو پیتھی معالجات
- 70 7- بچہ دانی کے ٹیو مر کے ہومیو پیتھی معالجات
- 74 8- اسقاط حمل کے ہومیو پیتھی معالجات

پہلا باب

مینارکی (MENARCHE)

اور

ڈسمنوریا (DYSMENORRHOEA)

دور حاضرہ میں ساج کی بگڑی ہوئی حالت اور جدید طرز تعلیم زنانہ امراض کی وجوہات ہیں جیسا کہ میں نے اپنی طبی پیشے کی مشاہداتی مدت کے دوران نتیجہ اخذ کیا ہے۔ ان وجوہات کی بنا پر بہت ساری لڑکیاں عہد شباب میں قدم رکھتے ہی اپنی صحت اور خوبصورتی کھو بیٹھتی ہیں آج ہمارے ساج میں عریانیت، بے راہ روی، بیجا کھلی آزادی اور بڑے چھوٹے کے درمیان شرم و حیا کی دیوار اس طرح ڈھادی گئی ہے کہ جیسے ایک ہی حمام میں سبھی ننگے نظر آتے ہیں۔ آج ٹی۔ وی کو تعلیم کا ذریعہ بنا کر پیش کیا جا رہا ہے۔ اس نقطہ نظر سے بیشک یہ درست خیال ہے مگر ساتھ ہی ساتھ اس کی آڑ میں مغربی تہذیب بھی منظر عام پر لائی جا رہی ہے۔ یہ وہی تہذیب ہے جس میں عریانیت، بے راہ روی اور جنسی آزادی کو بڑی اہمیت دی جاتی ہے۔ اس تہذیب کے منظر عام پر آنے کی وجہ سے آج ہمارے ساج میں بے انتہا برائیاں بڑی تیزی کے ساتھ پھیلتی جا رہی ہیں۔ چھوٹے چھوٹے بچے اور بچیاں اس سے بے حد متاثر ہوئے ہیں، جس کا نتیجہ یہ ہے کہ آج کل کی بچے اور بچیاں کم عمر میں ہی سن بلوغ کو پہنچ جاتی ہیں اور وہ گمراہی کے راستے میں بھٹکنے لگتے ہیں۔ ان کی یہ گمراہی غلط فعل و حرکت کی طرف اکساتی ہے۔ یہاں تک کہ بہت سی لڑکیاں بھٹک کر غلط قدم اٹھا لیتی ہیں۔ جس کا خمیازہ انہیں ہی بھگتنا پڑتا ہے۔ ان کی زندگی میں خوشی کے بدلے اداسی آجاتی ہے۔ ان کا مستقبل تاریک اور پریشان کن ہو جاتا ہے۔ ان لڑکیوں میں صحت کا بگڑنا گویا ایک ماں کی صحت کا بگڑنا ہے کیوں کہ آج کی بچیاں یا لڑکیاں مستقبل میں بننے

والی مائیں ہیں۔ نوجوانی کے دور میں ان کی صحت کے بگڑنے کی وجہ سے آگے چل کر ایسی لڑکیوں میں عمل آفرائش یعنی تولیدی قوت زائل ہو جاتی ہے۔

قدرت نے دنیا کی تمام لڑکیوں کو منفرد خصوصیات سے نوازا ہے۔ یہی وجہ ہے کہ دو لڑکیاں کبھی ایک جیسی نہیں ہو سکتیں۔ اسی اصول قدرت پر مبنی مختلف لڑکیوں کا عمل حیض ایک دوسرے سے جدا ہوتا ہے۔ اگرچہ عمل حیض ایک معمولی جسمانی و طبعی عمل ہے اور اگر یہ غیر معمولی طریقے سے ہوتا ہے تو اس گڑبڑ کی وجہ سے ایسی لڑکیوں میں بہت ساری دوسری بیماریاں جنم لیتی ہیں جن میں جٹلا ہو کر ان کی صحت دن بدن بگڑتی جاتی ہے۔

اکثر یہ دیکھا گیا ہے کہ دس سے بارہ برس کی عمر میں ماہواری یعنی عمل حیض شروع ہو جاتا ہے جسے طبی اصطلاح میں مینارکی (MENARCHE) کہتے ہیں۔ کوئی ضروری نہیں کہ یہ عمل اسی عمر میں ہی شروع ہو بلکہ مشاہدے سے یہ بات بھی سامنے آئی ہے کہ بعض لڑکیوں میں ماہواری دس سال سے پہلے بھی ہو جاتی ہے تو کچھ لڑکیوں میں بارہ سال کی عمر کے بعد بھی ہوتی ہے یعنی 10 سے 18 سال کے درمیان بھی کبھی کبھی شروع ہوتی ہے۔ عام طور پر لڑکیوں میں عمل حیض کا چکر 25 دن کا ہوتا ہے جسے ماہواری کا چکر کہتے ہیں اور جس کا وقفہ 4 سے 5 دن کا ہوتا ہے۔ ان چار پانچ روز میں جو علامتیں ظاہر ہوتی ہیں وہ درج ذیل ہیں۔

- (1) کمر، پیڑو یعنی پیٹ کا نچلے حصے میں بھاری پن کا احساس کرنا
- (2) سستی اور کمزوری کا احساس ہونا
- (3) سینے میں بھاری پن کا احساس ہونا
- (4) نیک خیالات کے اظہار کرنے کی چاہت
- (5) بار بار پیشاب کرنے کی حاجت محسوس کرنا
- (6) ہر شے سے دل اچاٹ ہو جانا
- (7) کسی بھی کام کرنے میں ناکام ہونے کا ڈر لگنا

(8) چڑا پن کا آنا

مندرجہ بالا تمام کیفیتیں اور علامتیں عورتوں کی بچہ دانی کی بیماریوں میں بھی ضرور پائی جاتی ہیں مگر یہ سب میں یکساں نہیں ہوتیں۔ جس طرح دو لڑکیوں کی خاصیت یکساں نہیں ہوتی ٹھیک اسی طرح دونوں کی بچہ دانی کی خاصیت میں بھی فرق ہوتا ہے۔ بعض دفعہ یہ بھی دیکھا گیا ہے کہ کوئی کوئی لڑکی اپنے بچہ دانی کو ٹھیک طرح سے سمجھ نہیں پاتی۔ اگر ایسی لڑکیوں کی پوری زندگی کی ماہواری کی سسٹری لی جائے تو پتہ چلے گا کہ عمل حیض کی تصویر ان میں یکساں نہیں رہی بلکہ ہمیشہ اس میں تبدیلی آتی رہی۔ ایسی لڑکیوں کو چاہئے کہ شرم و حیا سے گریز کرے اور کسی اچھے ڈاکٹر سے صلاح و مشورہ لے اور وقت پر اس کا علاج کرائے۔ آج کل زیادہ تر لڑکیوں میں یہ بات پائی جاتی ہے کہ ماہواری کے وقت درد کی شدت کی تاب نہ لا کر دوا کی دوکان سے درد کی گولی منگوا کر یا خود خرید کر کھالتی ہیں جس سے کچھ دیر کے لئے افاقہ ہی ہو جاتا ہے مگر آہستہ آہستہ اس درد کی شدت میں بھی ہر ماہ اضافہ ہی ہوتا رہتا ہے اور ہر ماہ اسی طرح خود سے اپنا علاج کرتی رہتی ہیں۔ مگر کسی سند یافتہ ڈاکٹر کے پاس جانے سے گریز کرتی ہیں۔ یہاں تک کہ اپنے گھر کے لوگوں سے کہنا بھی گوارا نہیں کرتیں۔ انہیں بھی اپنی کیفیت بتانے میں شرم و حیا محسوس کرتی ہیں۔ جس کا نتیجہ یہ ہوتا ہے کہ درد کی شدت حد سے زیادہ تجاوز کر جاتی ہے اور جس کے نتیجے میں بچہ دانی دوسرے مرض کا شکار ہو جاتی ہے۔ صرف یہی نہیں بلکہ اس طرح خود سے خرید کر یا دوا کی دوکان سے درد کی گولی کھا کھا کر اس سے پیدا ہونے والے برے اثرات سے بھی متاثر ہوتی ہیں جس سے صحت بھی بگڑنے لگتی ہے۔ دن بدن چہرے کی رونق ختم ہونے لگتی ہے۔ چہرے پر ایک طرح کی اداسی اور بے بسی کی تصویر نظر آتی ہے۔ ذہن پر بھی کافی اثر پڑتا ہے۔ چڑا پن حد درجہ یکساں رہتا ہے۔ کسی کی بات اچھی نہیں لگتی۔ یہاں تک کہ اگر کوئی اسکی بھلائی کے لئے اچھی باتیں کہتا ہے تو اسے گراں گزرتا ہے۔ ذرا ذرا سی بات پر غصہ آنے لگتا ہے گویا ہر وقت اس کی ناک پر

غصہ موجود رہتا ہے۔ یہاں تک کہ دوسروں کا مکر اپنے سے چھوٹوں کو مارنا بھی شروع کر دیتی ہیں۔ ہر ماہ اس طرح کا شدت کا درد ہونا طبی کی اصطلاح میں ڈسمنوریا (DYSMENORRHOEA) کہلاتا ہے۔ ایسی حالت میں درد کی گولی کھاتے رہنے سے مرض اور زیادہ پیچیدہ ہو جاتا ہے۔ اس وقت اگر یہ کسی اسپیشلسٹ ڈاکٹر سے علاج کرواتی ہیں تو انہیں DC کروانا پڑتا ہے جسے عام فہم زبان میں چھوٹا آپریشن کہا جاتا ہے۔ کبھی کبھی تو یہ بھی دیکھا گیا ہے کہ ایسی مریضہ کو دوبارہ یہاں تک کہ تین تین بار یہ آپریشن کروانا پڑتا ہے۔ اس طرح کی پریشانی و مصیبت خود کی پیدا کردہ ہوتی ہے جس میں کافی وقت برباد ہوتا ہے ساتھ ہی ساتھ کافی پیسہ بھی خرچ ہو جاتا ہے۔ بار بار اس طرح کے چھوٹے آپریشن کروانے سے بچہ دانی میں سو جن ہو جاتی ہے جو آگے چل کر عمل افزائش میں رکاوٹ ڈالتی ہے۔ ایسی مریضہ میں یہ بھی دیکھا گیا ہے کہ شادی کے بعد حمل کے ٹھہرنے میں دشواری ہوتی ہے۔ حمل زائل ہو جاتا ہے۔ اسی طرح ایسی لڑکیاں کافی دشواری، ذہنی تناؤ اور مصیبتوں سے گزرتی ہیں۔ ان لڑکیوں کو ماں بننے میں کافی وقت لگ جاتا ہے، ماں کے نہ بننے میں یا ماں کے بننے میں تاخیر ہونے کی وجہ سے ایک خوشحال اور سنہرے سنار میں تناؤ کی دیوار کھڑی ہو جاتی ہے یہاں تک کہ بعض دفعہ تو یہ بھی دیکھا گیا ہے کہ بات طلاق تک جا پہنچتی ہے۔ اس طرح دو زندگیاں برباد ہو جاتی ہیں۔ آج کے دور میں صبر و تحمل بہت کم لوگوں میں پایا جاتا ہے۔ لوگ ایک دوسرے کو شک کی نگاہ سے دیکھتے ہیں کسی کی بے بسی اور مجبوری میں بھی کھوٹ نظر آتا ہے لہذا ایسی نوبت نہ آئے تو بہتر ہے۔

اس کے لئے شرط یہی ہے کہ ہر لڑکی کو چاہئے کہ ایام ماہواری میں درد کی نکیہ خود سے خرید کر نہ کھائیں۔ ایسی دواؤں سے بالکل پرہیز کریں۔ ایسے وقت میں گھر کے لوگوں سے کچھ نہ چھپائیں اور نہ ہی شرم کریں۔ بلکہ انہیں اپنی تمام تکالیف بتائیں تاکہ گھر کے وارث یا دوسرے لوگ ڈاکٹر کے پاس لے جا کر وقت پر علاج کرا سکیں۔ خود سے ڈاکٹر کو صاف صاف اپنی کیفیتیں بتائیں۔ شرم سے کسی بات کو نہ

چھپائیں کیوں کہ آدمی بات کہنے سے علاج ٹھیک نہیں ہو پاتا۔ بہت سے لوگوں کا خیال ہے کہ ایسی بیماریوں میں چھوٹا آپریشن ضروری ہوتا ہے مگر حقیقت اس کے برعکس ہے ان بیماریوں کا ہومیوپیتھی میں پورا اور کامیاب علاج ہوتا ہے۔ اس لئے ایسے حالات میں مریضوں کو چاہئے کہ کسی تجربہ کار اور سند یافتہ ہومیوپیتھی ڈاکٹر سے علاج کے لئے رجوع کریں کیوں کہ ہومیوپیتھی میں اس طرح کی بیماریوں کے لئے سینکڑوں دوائیں ہیں۔

دوسرا باب

آمینوریا (AMENORRHOEA) و یکیریس مینسٹروایشن (VICARIOUS MENSTRUATION)

اور

حیض کا دب جانا (SUPPRESSION OF MENSES)

آپ کو یاد ہوگا کہ ”زنانہ امراض اور ان سے تحفظ“ کے عنوان سے منسلک پہلے باب میں میں ڈسمنوریا سے متعلق تفصیل بیان کرچکا ہوں۔ اس باب میں میں نے ان حالات کا ذکر کیا ہے جو دوران حیض کبھی کبھی رونما ہوتے ہیں، جن کا اثر حیض پر پڑتا ہے۔ اس کی وجہ سے یا تو کبھی کبھی حیض رک جاتا ہے یا پھر اس کی نوعیت بدل جاتی ہے جس کے نتیجے میں مریضہ کی صحت متاثر ہوتی ہے۔ اکثر یہ بات مشاہدے سامنے آئی ہے کہ لڑکیاں یا عورتیں ایسے حالات پر توجہ ہی نہیں دیتیں۔ اس لاپرواہی کی وجہ سے مستقبل میں انہیں بڑی پریشانیوں کا سامنا کرنا پڑتا ہے۔

بعض لڑکیوں میں یہ بھی دیکھا گیا ہے کہ پہلا حیض، عمر مخصوص گزر جانے کے بعد بھی نہیں ہوتا۔ بچیوں کے والدین اپنی بچیوں کی اس حالت (جسے طبی اصطلاح میں آمینوریا کہتے ہیں) سے بڑے پریشان و حیران ہو جاتے ہیں جب کہ ایسی حالت میں پریشان نہ ہو کر انہیں اپنی بچیوں کی صحت پر دھیان دینا چاہئے کہ ایسی حالت میں انہیں خون کی کمی کی بیماری - انیمیا یا ٹی۔ بی کا مریض تو نہیں ہو گیا کیوں کہ اکثر یہ دیکھا گیا ہے کہ نوجوان لڑکیوں میں خاص کر سن بلوغ میں پہنچنے والی لڑکیوں میں پہلے حیض کی تاخیر کی وجہ ان دو بیماریوں میں سے کوئی ایک بھی ہو سکتی ہے لہذا ان حالتوں میں ایسی لڑکیوں کو ڈاکٹر سے طبی معائنہ کرانا لازمی ہوتا ہے تاکہ روکاؤٹ حیض ختم کی جاسکے۔

دوسری بات جو مشاہدے میں آئی ہے وہ یہ ہے کہ کچھ حالات ایسے ہوتے ہیں

جن کے اثر سے لڑکیوں یا عورتوں میں عمل حیض دب کر خون کا بہنا بند ہو جاتا ہے۔
 حیض کے دب جانے سے ان کی صحت کافی متاثر ہوتی ہے جس کے نتیجے میں دوسرے
 امراض جنم لیتے ہیں۔ اس سلسلے میں ایک ایسی ہی مریضہ کا واقعہ پیش کرتا ہوں۔ اس
 مریضہ کی عمر لگ بھگ 17 سال تھی جو غیر شادی شدہ تھی۔ اس لڑکی نے اپنے ماموں
 کے گھر پرورش پائی تھی اور بچپن سے ان ہی کے گھر میں مقیم رہی۔ ایک طرح سے وہ
 اپنے ماموں کی لے پالک بیٹی بن گئی تھی۔ بڑے پیار و شفقت کے ساتھ اس کے
 ماموں نے اس کی پرورش کی۔ اچانک ایک دن ہارٹ فیل ہو جانے سے اس کے ماموں
 کا انتقال ہو گیا۔ موت کا یہ سانحہ اس کی آنکھوں کے سامنے ہی ہوتا ہے۔ جسے وہ
 برداشت نہیں کھاتی ہے۔ اس حادثہ کا اثر اس کے ذہن پر کافی پڑتا ہے اور پھر
 دوسرے دن سے بالکل اداس اور خاموش رہنے لگتی ہے۔ سر میں کافی درد ہوتا ہے۔
 بخار کی وجہ سے بدن ہر وقت ہٹتا رہتا ہے۔ علاقے کے کئی مشہور ڈاکٹروں سے علاج
 بھی کرایا جاتا ہے لیکن کوئی خاطر خواہ نتیجہ نہیں نکلتا ہے۔ اس طرح ڈیڑھ ماہ کا عرصہ
 گزر جاتا ہے۔ صحت کافی گر چکی ہوتی ہے۔ چہرہ پیلا پڑ جاتا ہے۔ کھانے پینے اور بات
 چیت کرنے میں ذرا بھی طبیعت نہیں لگتی۔ ایک دن میرے دواخانہ میں اس کی والدہ
 اسے علاج کے لئے لاتی ہیں۔ تفصیل سے ہسٹری لکھتے وقت جب حیض کے بارے میں
 سوال کیا جاتا ہے تو اس کی والدہ مداخلت کرتے ہوئے کہتی ہیں۔ ”ڈاکٹر صاحب جس
 دن سے اس کے ماموں کا انتقال ہوا اسی دن سے اس کا حیض رک گیا۔“ میں نے پھر
 ایک سوال کیا ”کیا اس کے ماموں کے انتقال کے دن وہ حیض میں تھی؟“ اس کی والدہ
 نے اس سے پوچھ کر مجھے بتایا کہ وہ دن اس کی طبیعت کی خرابی کا دوسرا ہی دن تھا۔
 (عام طور پر جاہل اور کم پڑھی لکھی عورتیں اور لڑکیاں ماہواری کے عمل کو طبیعت
 خراب ہونے سے تعبیر کرتی ہیں۔) اس مریضہ کی صحت کی خرابی کی وجہ یعنی صدے
 کی وجہ سے حیض کا رک جانا! اسی بنیاد پر میں نے اسے ہومیوپیتھی کی ایک دوا
 (اگیشیا) دی جس کے استعمال کے دو دن بعد بخار پوری طرح سے ختم ہو گیا اور اس

کے پانچ روز کے بعد پھر سے اس کا حیض شروع ہو گیا ایک ماہ کے بعد اس کی صحت پہلی جیسی ہو گئی۔ اس مریضہ کی کہانی جان کر آپ اس بات سے اچھی طرح واقف ہو گئے ہوں گے کہ دوران حیض ذہنی صدمہ یا شوک (Shock) لگنے سے حیض دب جاتا ہے۔ جس کے نتیجے میں صحت بری طرح متاثر ہوتی ہے۔

مندرجہ بالا کیفیت کے علاوہ کچھ اور بھی حالات ہیں جو دوران حیض اگر رونما ہوتے ہیں تو اس سے خواتین کی صحت متاثر ہوتی ہے۔ مثال کے طور پر اگر کسی لڑکی یا عورت کو حیض ہو رہا ہو اور دوران حیض اسے برا بھلا کہہ کر اس کی رسوائی کی جائے اور اس بات کا اس کے ذہن پر اثر پڑے یا پھر وہ غصے سے جھنجھلا کر اس بات کا رد عمل ظاہر کرے تو اس کی ماہواری اس کی وجہ سے رک سکتی ہے۔ دوران حیض ٹھنڈے پانی سے غسل کرنے یا حد سے زیادہ ناچنے کودنے والے کھیل مثلاً رسی سے کودنے سے بھی حیض رک سکتا ہے۔ صرف یہی نہیں بلکہ دوران حیض سردی میں سیر و تفریح کرنے سے بھی عمل رک سکتا ہے۔ لہذا ایسے حالات سے پرہیز کرنا بہت لازمی ہے۔

اگر ان حالات کی وجہ سے ماہواری رک جائے تو فوراً بلاتا خیر کسی بھی تجربہ کار اور سند یافتہ ڈاکٹر سے رجوع کریں تاکہ لڑکیاں خرابی صحت سے محفوظ رہ سکیں، کبھی کبھی یہ بھی دیکھا جاتا ہے کہ حیض کی مقررہ تاریخ میں حیض نہ ہو کر لڑکیوں یا عورتوں کی ناک سے خون گرتا ہے جسے طبی اصطلاح میں ویکیریس مینسٹروایشن (Vicarious Menstruation) کہتے ہیں۔

حیض کی پوری مدت تک یعنی تین چار دن تک رک رک کر تھوڑا تھوڑا خون ناک سے بہتا رہتا ہے۔ ایسے حالات میں مریضہ کی دیکھ بھال صحیح طریقے سے کرنا ضروری ہے۔ اس وقت خود کو کیسے کنٹرول رکھا جائے یہ نہ جاننے سے بیماری ہوتی ہے کبھی کبھی اس علم کی کمی سے اس کی زندگی کو خطرہ لاحق ہو سکتا ہے۔ اس وقت جسمانی اور دماغی توازن کا ہونا ضروری ہے۔ اس وقت غیر ضروری جسمانی اور دماغی دباؤ لانا

ٹھیک نہیں۔ اگر ایسے وقت میں مریضہ کی صبح دیکھ بھال اور مناسب علاج نہ کرایا جائے تو اس حالت میں بچہ دانی پر بھی اثر پڑ سکتا ہے، اس لئے اس وقت اچھی غذا، کافی آرام، کھلی ہوا کے ساتھ ساتھ ڈاکٹر کے مشورے کو اپنائیں۔

بعض دفعہ یہ بھی دیکھا جاتا ہے کہ کچھ لڑکیوں یا عورتوں میں عمل حیض کے بدلے دھات کی بیماری ہو جاتی ہے جسے (LEUCORRHOEA) کہتے ہیں۔ اگر یہ مرض اسی طرح جاری رہے تو حیض دبا رہے گا۔ جس کے نتیجے میں مریضہ کی صحت کافی بگڑتی جائے گی۔ ایسے حالات میں ہومیوپیتھی کافی موثر اور شفا بخش ثابت ہوتی ہیں۔

تیسرا باب

لیکوریا

(LEUCORRHOEA)

پچھلے دو ابواب میں زنانہ امراض سے متعلق کچھ بیماریوں اور کچھ ایسے حالات کا ذکر کیا گیا جس کے نتیجے میں حیض کی گڑبڑ ہوتی ہے جو بالآخر مریضہ کی صحت کو متاثر کرتے ہیں۔ ماہواری کا نہ ہونا یعنی آمینوریا (Amenorrhoea) یا حیض کا دب جانا (Suppression of Menses) جیسی بیماریوں کے بارے میں تفصیلات بیان کی گئیں۔ ساتھ یہ ساتھ اس کی پیچیدگیوں سے بچنے کے بارے میں بھی ذکر کیا گیا۔ آخر میں یہ درج کیا گیا تھا کہ بعض دفعہ یہ بھی دیکھا جاتا ہے کہ حیض نہ ہو کر سفید اور دوسری شکل کی رطوبت خارج ہوتی ہے جو پورے وقفہ حیض تک جاری رہتی ہے۔

اس باب میں اسی رطوبت کے اخراج سے متعلق تفصیل بیان کی جا رہی ہے۔ سب سے پہلے تو آپ یہ جان لیں کہ لیکوریا (Leucorrhoea) کسے کہتے ہیں؟ خواتین میں اندام نہانی سے غیر خونی اور غیر متعدی رطوبت کا خارج ہونا لیکوریا کہلاتا ہے۔ بیشتر لڑکیاں یا خواتین اسے عام زبان میں دھات گرنے کی بیماری سے تعبیر کرتی ہیں۔ خاص کر اردو اور ہندی زبان کے بولنے والے اس بیماری کو اسی نام سے پکارتے ہیں جب کہ بنگلہ زبان میں اسے ”ساد اسراب“ کہہ کر پکارتے ہیں۔ یہ ایک ایسا مرض ہے جو عام ہوتا جا رہا ہے اور جو کم و بیش ہر عمر کی بچیوں اور عورتوں میں دیکھا جاتا ہے یعنی چھوٹی بچیوں، بالغ لڑکیوں، شادی شدہ یا غیر شادی شدہ عورتوں اور حتیٰ کہ ضعیف العمر خواتین میں بھی اس مرض کا حملہ ہو سکتا ہے۔ لیکن زیادہ تر اس مرض کا شکار بالغ لڑکیاں اور متوسط عمر کی عورتیں ہیں۔ عام عورتوں کا یہ خیال ہے کہ یہ رطوبت صرف

سفید رنگ کا ہوتا ہے جب کہ حقیقت اس کے برعکس ہے۔ بعض مریضوں میں اس کا رنگ کالا، غیر رنگ دار، چاکلیٹی اور پیلا ہوتا ہے تو بعض میں نیلا یا سبز اور دودھ کے رنگ جیسا۔ یہ گاڑھا بھی ہوتا ہے تو بعض میں پتلا بھی۔ بعض میں بالکل پانی کے جیسا تو بعض میں لیسدار۔ کبھی کبھی تو دھاگے کی طرح لٹک کر زمین پر گرتا ہے۔ کچھ عورتوں میں یہ چونے کی مانند ہوتا ہے۔ اکثر و بیشتر یہ عورتوں میں انڈے کی سفیدی یا بھات کے ماند کے جیسا خارج ہوتا ہے۔ بعض عورتوں میں یہ گوشت کے دھوئے ہوئے پانی یا مچھلی کے دھوئے ہوئے پانی کے مانند ہوتا ہے۔ اس کے اخراج کا احساس زیادہ تر عورتوں کو شروع میں نہیں ہوتا ہے کیوں کہ اس وقت اس کی وجہ سے نہ کوئی تکلیف ہوتی ہے نہ کوئی علامت اجاگر ہوتی ہے لیکن جب یہ حد سے زیادہ خارج ہوتا ہے یا پھر بہت روز تک اس رطوبت کا اخراج ہوتا رہتا ہے تو اس حصے میں یا جانگھ میں خارش ہوتی ہے۔ کچھ عورتوں میں یہ رطوبت گرم ہوتا ہے جس کی وجہ سے مریضہ کو فوراً اس کا احساس ہو جاتا ہے۔ اسے ایسا احساس ہوتا ہے کہ جیسے اس مخصوص حصے سے گرم پانی یا کوئی گاڑھا رطوبت پاؤں تک بہہ رہا ہو۔ زیادہ تر عورتوں میں یہ گرم نہیں ہوتا۔ اس رطوبت میں اکثر و بیشتر کسی قسم کی بدبو نہیں ہوتی مگر کچھ کچھ عورتوں میں یہ دیکھا گیا ہے کہ ان سے خارج ہونے والا رطوبت بدبودار ہوتا ہے۔ عموماً عورتوں یا لڑکیوں میں یہ پایا گیا ہے کہ اس اخراج سے پیڑو یعنی پیٹ کے نچلے حصے میں درد نہیں ہوتا ہے۔ لیکن بعض مریضوں میں اس رطوبت کے اخراج سے پیٹ میں درد بھی ہوتا ہے۔ اس کے علاوہ کمر اور کولے کی ہڈی کے حصوں میں بھی درد ہوتا ہے۔

جس طرح اس رطوبت کے رنگ میں تضاد ہے اسی طرح اس کے حالات اخراج میں بھی یکسانیت نہیں ہوتی۔ یہ ماہواری سے پہلے بھی ہوتا ہے تو بعض میں ماہواری کے بعد۔ کچھ عورتوں یا لڑکیوں میں تو ماہواری سے پہلے اور ماہواری کے بعد دونوں حالتوں میں ہوتا ہے۔ یہاں تک کہ یہ حاملہ عورتوں میں بھی خارج ہوتا ہے۔

کچھ عورتوں یا لڑکیوں میں اس رطوبت کا اخراج چلنے پھرنے، کام کاج کرنے اور کھیلنے کو دینے سے بڑھتا ہے اور آرام کرنے سے کم ہو جاتا ہے۔ بعض مریضاؤں میں تو یہ دیکھا گیا ہے کہ دن کے وقت یہ رطوبت زیادہ خارج ہوتا ہے تو رات کو کم یا پھر کسی میں رات کے وقت زیادہ ہوتا ہے تو دن کے وقت کم۔ گویا اس مرض کی نوعیت عجیب و غریب ہے۔ جس پر اچھی طرح دھیان دینا مریضہ کے لئے نہایت ہی ضروری ہے کیوں کہ اس مرض کی مریضہ کے علاج کے وقت ان باتوں کو مد نظر رکھ کر ہی دوا تشخیص کی جاتی ہے۔ اکثر عورتیں یا لڑکیاں ڈاکٹروں سے صرف یہی کہہ کر خاموش ہو جاتی ہیں کہ ”مجھے دھات کی بیماری ہے۔“ اس مرض کی تفصیل بتانے سے شرماتی ہیں۔ زیادہ تر یہی دیکھا گیا ہے کہ وہ شرم و حیا کی وجہ سے اپنے مرض کو چھپائے رکھتی ہیں۔ نہ تو اپنے والدین سے کہتی ہیں اور نہ ہی گھر کے کسی اور فرد سے۔ جس کا نتیجہ یہ ہوتا ہے کہ آہستہ آہستہ یہ مرض بڑھتا رہتا ہے اور پھر یہ کہہ یعنی پرانا مرض کہلاتا ہے۔ اس لاپرواہی کی وجہ سے مریضہ کی صحت پر گہرا اثر پڑتا ہے۔ دن بدن مریضہ کا جسم دبلا ہونے لگتا ہے۔ وزن میں کمی آ جاتی ہے۔ چہرے پر اداسی اور پڑمردگی چھا جاتی ہے۔ چہرے اور جسم کی خوبصورتی ختم ہونے لگتی ہے۔ نوجوانی میں عمر دراز معلوم ہوتی ہے۔ چہرے کی رونق غائب ہو جاتی ہے۔ جلد یعنی چمڑے سے چمک ختم ہو کر سوکھے پڑنے لگتے ہیں۔ ایسی مریضہ کا بدن بھی کافی سوکھ جاتا ہے۔ بھوک اور پیاس بھی آہستہ آہستہ ختم ہونے لگتی ہے۔ ذہن کافی چڑچڑا ہو جاتا ہے کسی کی بھی بات اچھی نہیں لگتی کسی کام کاج میں دل نہیں لگتا۔ زندگی سے اکتاہٹ معلوم ہوتی ہے۔ ہر وقت نیند کا غلبہ رہتا ہے۔ وہ کچھ دیر بیٹھنے کے بعد ہی لیٹ جاتی ہے اور پھر فوراً نیند آ جاتی ہے۔ اگر ایسی مریضہ کو اس کے حال پر چھوڑ دیا جائے تو سارا سارا دن وہ سو کر گزار دے گی۔ ان مریضاؤں میں حد درجہ کمزوری آ جاتی ہے۔ سر چکرائے لگتا ہے۔ چلتے وقت ایسا معلوم ہوتا ہے کہ وہ کچھ ہی دیر میں گر پڑیں گی۔ پاؤں اپنے آپ لڑکھڑانے لگتے ہیں۔ اسی لئے چلنے پھرنے کی ذرا بھی طبیعت نہیں کرتی۔ درد سے کمر ہر وقت جکڑی

رہتی ہے۔ ہاتھ اور پاؤں میں سنسناہٹ اور کھینچاؤ ہوتا رہتا ہے۔ ایسا احساس ہوتا ہے کہ جیسے کوئی ان کے ان اعضاء کو اوپر کی طرف کھینچ رہا ہو۔ کھانا پینا کم ہو جانے کی وجہ سے ایسی مریضوں کو قبض کی بیماری بھی ہو جاتی ہے۔

اس لئے ایسی مریضوں کو چاہئے کہ اس مرض کے متعلق شروعات میں ہی شرم و حیا کو بلائے طاق رکھ کر اپنے والدین سے کہیں تاکہ ان کے والدین ان کا اسی وقت علاج کروا سکیں۔ شروع شروع میں اس کا علاج کرانے سے بہت جلد شفا یابی مل جائے گی۔ انشاء اللہ! اس مرض سے پیدا ہونے والی پیچیدگیوں سے بھی مستقبل میں تحفظ مل جائے گا۔ یہ بات تجربے سے سامنے آئی ہے کہ اس مرض کی وجہ سے بچہ دانی پر بھی اثر پڑتا ہے۔ جس سے کبھی کبھی بہت سی شادی شدہ لڑکیوں کو ماں بننے میں رکاوٹ ہوتی ہے۔ علاج کے وقت ڈاکٹروں سے کچھ نہ چھپائیں بلکہ تفصیل سے اس کی علامتوں اور کیفیتوں کو بتائیں جیسا کہ اوپر درج کیا گیا ہے کیوں کہ ہومیو پیتھی میں اس کے لئے سینکڑوں دوائیں ہیں لیکن ہر دوا کی علامت جدا جدا ہے۔ علاج کے دوران اندازاً کھٹی چیزوں اور چکنی غذاؤں سے پرہیز لازمی ہے۔ رطوبت خارج ہونے والے حصوں کو دن میں دو تین بار سم گرم پانی سے سینکنا اور ان حصوں کو اصول صحت کے قواعد کے مطابق صاف ستھرا رکھنا اور صاف ستھرے کپڑے پہننا ضروری ہے۔ اچھی اور پروٹین والی غذاؤں مثلاً دودھ، مچھلی، پھل اور ساگ سبزی کا استعمال مفید ہے۔ روزانہ غسل کرنا اور تھوڑی بہت ورزش یا آسن کرنا اچھی بات ہے۔ ہومیو پیتھی میں اس کا آسان آرام دہ اور مناسب علاج ہوتا ہے جس سے مرض کا دائمی طور پر انسداد ہو جاتا ہے۔

چوتھا باب

مینور میجیا (MENORRHAGIA)

اور

میٹرور میجیا (METRORRHAGIA)

اس باب میں دو ایسے امراض کا تذکرہ ہے جو سن بلوغ میں پہنچنے والی لڑکیوں اور درمیانی عمر کی خواتین یا ضعیفی میں قدم رکھنے والی عورتوں میں عام طور سے دیکھے جاتے ہیں جنہیں علی الترتیب مینور میجیا (MENORRHAGIA) اور میٹرور میجیا (MET-RORRHAGIA) کہتے ہیں۔

اول الذکر مرض یعنی مینور میجیا عام طور پر ان نو عمر لڑکیوں میں دیکھا جاتا ہے جو سن بلوغ میں قدم رکھتی ہیں اور ان کی زندگی میں اس وقت پہلی ماہواری شروع ہوتی ہے جس سے وہ نابلد رہتی ہیں۔ اس طرح پہلی ماہواری کے خون کو دیکھ کر ان کے دل و دماغ پر اثر پڑتا ہے اور کچھ حد تک وہ خوفزدہ بھی ہو جاتی ہیں۔ ان کے چہرے کو دیکھ کر ان کی ذہنی پریشانی و الجھن اور ان کے خوف و ہراس کے اندازے لگائے جاسکتے ہیں۔ اس وقت ان کے والدین اور وارثوں کا فرض ہے کہ انہیں حقیقت سے آشنا کرائیں اور تسلی دیں۔ ساتھ ہی ساتھ اس قدرتی عمل سے متعلق بتائیں جس سے انہیں ذہنی سکون و اطمینان ملے۔ ایسے حالات میں اگر سوائے خون کے بننے کے اور کوئی دوسری علامت یا تکلیف ظاہر نہ ہو تو دوا کی ضرورت نہیں پڑتی لیکن اگر حد سے زیادہ خون بنے لگے حتیٰ کہ چار پانچ روز کے بجائے ہفتے یا دو ہفتے تک خون اسی رفتار سے بہتا رہے۔ اس کے بعد کچھ نارمل ہو جانے کے بعد پھر اسی طرح خون بنے لگے یا خون بہتے بہتے دو سہ ماہ حیض آجائے تو اس حالت کو بیماری کی حالت سمجھی جائے گی جسے مینور میجیا کہتے ہیں، ایسی حالت میں دو طرح کے مریض پائے جاتے ہیں۔ ایسی مریضہ کی پہلی نوعیت تو وہ ہے جس میں ماہواری 28 روز کے بعد ہوتی ہے

مگر خون کا بہنا حد سے زیادہ اور سات یا آٹھ یا پھر دس دن تک جاری رہتا ہے اور اس طرح ہر ماہ ماہواری کا چکر چلتا رہتا ہے جسے مینور میچیا کہتے ہیں۔ مریضہ کی دوسری نوعیت وہ ہے جس میں خون دوران حیض حد سے زیادہ تو بہتا ہی ہے مگر ایک ماہ میں دو یا تین بار ہو جاتا ہے یعنی ہر 15 روز کے بعد یا 20 روز کے بعد یا پھر 10 روز کے بعد خون کافی مقدار میں کافی دن تک بہتا رہتا ہے۔ مینور میچیا کی اس قسم کو پولی مینور میچیا (POLYMENORRHAGIA) کہتے ہیں۔ بعض بعض مریضوں میں یہ بھی دیکھا جاتا ہے کہ پہلا حیض ٹھیک طرح سے ہوا تو دوسری ماہ حد سے زیادہ اور کافی روز تک خون بہتا رہتا ہے۔ بالغ لڑکیوں میں بننے والے خون کا رنگ اکثر و بیشتر بالکل سرخ یعنی لال ہوتا ہے لیکن بعض بعض دفعہ رقیق خون کے ساتھ کالے رنگ کا جما ہوا خون کا پتھمڑ بھی نکلتا رہتا ہے۔ کبھی کبھی یہ بھی دیکھا جاتا ہے کہ اخراج ہونے والا مادہ تھوڑا رقیق اور تھوڑا جما ہوا ہوتا ہے۔ کچھ مریضوں میں خون پیچ کی مانند ہوتا ہے، تو کچھ میں گوشت کے دھوئے ہوئے پانی جیسا۔

حاملہ عورتوں میں بچہ کے نقصان ہو جانے سے بھی کافی مقدار میں خون بننے لگتا ہے اور کئی کئی روز تک خون بہنا جاری رہتا ہے۔ مانع حمل (ABORTION) کے بعد بھی اس طرح کی حالت پائی جاتی ہے۔ اس کے علاوہ ایک اور حالت ہے جس میں خون کافی مقدار میں کئی دنوں تک بہتا رہتا ہے۔ بچہ جننے کے بعد ایسی حالت دیکھی جاتی ہے۔

ایسے حالات میں مریضہ کے پیٹ کے نچلے حصے یعنی پیڑوں میں بھاری پن کا احساس اور تپاؤ ہوتا رہتا ہے۔ پیڑوں میں درد بھی ہوتا ہے جہاں سے درد جاگھ یہاں تک کہ پاؤں تک پھیلتا ہے۔ کبھی کبھی تو درد کمر تک پھیل جاتا ہے اور کچھ میں تو سینے تک درد ہونے لگتا ہے۔

چونکہ مینور میچیا میں مریضہ کے جسم سے کافی خون نکل جاتا ہے اس لئے ایسے حالات میں مریضہ کو چاہئے کہ وہ علاج کے لئے مرض کی شروعات ہی میں ڈاکٹر سے

رجوع کرے۔ ایسے مواقع پر شرم و حیا کو بالائے طاق رکھ کر اپنی تمام کیفیات ڈاکٹر کو بتائے۔ اکثر یہ بات تجربے میں دیکھی گئی ہے کہ سن بلوغ میں پہنچنے کے بعد جب یہ مرض نوجوان لڑکیوں کو ہوتا ہے تو وہ شرم و حیا کی وجہ سے ڈاکٹر کے پاس جانے سے شرماتی ہیں۔ یہاں تک کہ اسی طرح دو تین ماہ گزر جاتے ہیں اور جب مرض حد سے زیادہ بڑھ جاتا ہے اور قوت برداشت ختم ہو جاتی ہے تب ڈاکٹر سے رجوع کرتی ہیں اس وقت تک جسم سے کافی خون بہہ چکا ہوتا ہے جو صحت کے لئے نقصان دہ ہے۔ کیوں کہ جسم سے خون کا کافی مقدار میں کافی دنوں تک خارج ہوتے رہنے سے خون کی کمی کی بیماری (ANAEMIA) یعنی اہنمیا کے ہونے کا خدشہ رہتا ہے اور یہ ایک ایسی بیماری ہے کہ کبھی کبھی اس مرض کے مریضوں میں خون چڑھانے کی نوبت تک آ جاتی ہے۔ لہذا ایسی نوبت آنے سے پہلے اس کا تحفظ کرنا بہتر عمل ہے اور یہ تحفظ اسی وقت ہو گا جب مریضائیں اس مرض کی شروعات ہی میں شرم و حیا کو بالائے طاق رکھ کر تجربہ کار اور سند یافتہ ڈاکٹر سے علاج کرائیں۔ عین وقت پر دوا کے استعمال سے مرض بڑھ نہیں پائے گا۔ جس سے جسم کا کافی خون زائل ہونے سے بچ جائے گا اور جب زیادہ خون ہی نہیں نکلے گا تو اہنمیا یعنی خون کی بیماری بھی نہیں ہوگی۔ اس مرض کا علاج ہومیو پیتھی میں نہایت ہی موزوں اور اطمینان بخش ہے۔ ایسی مریضوں کے لئے ہومیو پیتھی میں ایک نہیں بہت ساری دوائیں فراہم ہیں جن کا استعمال بہت ہی آسان ہے اور اس سے جسم پر کوئی برا اثر بھی نہیں ہوتا۔

اس باب کے عنوانات میں موخر الذکر مرض یعنی میٹروپیجا (MERRORHAGIA) ایک ایسا مرض ہے جس میں مریضہ کی پچہ دانی سے خون رک رک کر ایک لمبی مدت تک بہتا رہتا ہے۔ اس مرض کا ماہواری کے چکر سے کوئی تعلق نہیں جیسا کہ مینور پیجا میں دیکھا جاتا ہے۔ اس مرض میں خون کی مقدار مینور پیجا کے مقابلے میں کم خارج ہوتی ہے۔ اس حالت میں خون کے ساتھ جما ہوا خون کا تھکا زیادہ خارج ہوتا ہے۔ پچہ دانی میں کوئی مرض کے ہونے سے ہی اس مرض

سے شروعات ہوتی ہے۔ یہی وجہ ہے کہ اس مرض کا حملہ اکثر و بیشتر بیس سال یا پچیس سال کے بعد کی عورتوں میں ہوتا ہے۔ اس مرض کے ہونے کے اسباب کئی ہیں۔ عام طور پر آپ نے سنا ہوگا کہ جب کسی عورت کو معمول کے مطابق حیض نہیں ہوتا تو حمل ٹھہرنے میں رکاوٹ ہوتی ہے۔ اس وقت ڈاکٹر انہیں چھوٹے آپریشن یعنی ڈی اینڈ سی (D and C) کا مشورہ دیتے ہیں یا پھر کبھی کبھی پچہ دانی کے کسی حصے سے خون کو بننے سے روکنے کے لئے بھی الیکٹرک کے ذریعے اس حصہ کو جلایا جاتا ہے جس سے خون کا بہنا تو بند ہو جاتا ہے مگر بعد میں میٹرو بیجا کی بیماری جنم لیتی ہے۔ اگر پچہ دانی میں کوئی ٹیو مر ہو جائے تو اس کی وجہ سے بھی یہ مرض ہوتا ہے۔ پچہ دانی میں کینسر کا ہونا اس کی تیسری وجہ ہے۔ بعض عورتوں کی پچہ دانی میں پولپ (POLYP) ہو جاتا ہے۔ اس کی وجہ سے بھی میٹرو بیجا کا مرض ہوتا ہے۔ حمل کو گرانے یعنی واش کرانے (ABORTION) سے بھی یہ مرض ہوتا ہے۔ زچگی کے بعد اگر زچہ یعنی ماں کے رحم یعنی پچہ دانی میں پلائیشا کا تھوڑا سا بھی حصہ رہ جاتا ہے تو اس کی وجہ سے بھی میٹرو بیجا ہو سکتا ہے۔ جب عورتیں پچہ جننے کے لائق والی عمر کو پار کر جاتی ہیں تو اس اسٹیج کو مینوپاؤز (MENOPAUSE) کہتے ہیں۔ اس اسٹیج میں اکثر و بیشتر عورتوں کو میٹرو بیجا کی بیماری لاحق ہوتی ہے۔ ان اسباب کے باوجود کچھ حالات ایسے ہیں جو اس مرض کی وجوہات ثابت ہوئی ہیں مثلاً غصہ کے بعد، مباشرت کے بعد اور ڈر و خوف کے بعد میٹرو بیجا کے مرض کو دیکھا گیا ہے۔

مندرجہ بالا تمام باتوں سے یہی نتیجہ اخذ ہوتا ہے کہ میٹرو بیجا کی بیماری سے کچھ حد تک عورتیں محفوظ رہ سکتی ہیں اگر اس کے اسباب سے بچا جائے مثلاً بار بار چھوٹے آپریشن یعنی کیورینج سے پرہیز کریں۔ اسی طرح بار بار واش یعنی حمل کو نہ کروائیں۔ بار بار حمل کے گرانے سے پچہ دانی میں سوجن آ جاتی ہے اور پھر اس کے سبب میٹرو بیجا ہو جاتا ہے لہذا ان باتوں سے پرہیز بہت ہی ضروری ہے جب ہی تو میٹرو بیجا سے تحفظ ہو سکتا ہے۔

جس طرح مینور میچا کی لئے ہومیو پیتھی میں کافی دوائیں موجود ہیں ٹھیک اسی طرح میٹور میچا کے مریضوں کا مناسب اور شفا بخش علاج ہومیو پیتھی سے ممکن ہے۔ اس لئے مریضوں کو چاہئے کہ ایسے حالات میں جلد از جلد ہومیو پیتھی ڈاکٹر سے رجوع کریں تاکہ وہ ان بیماریوں کی پیچیدگیوں سے محفوظ رہ سکیں۔



پانچواں باب

بچہ دانی میں ٹیومر (UTERINE TUMOUR) یا مائیوفائبروما
(MYOFIBROMA)

یا
یوٹیرائن فائبرائیڈ (UTERINE FIBROID)

مینور سیجا اور میٹرو سیجا کی تفصیلات پچھلے باب میں درج کی گئی ہیں جنہیں پڑھ کر کم از کم آپ کو اس بات کا اندازہ ضرور لگ گیا ہوگا کہ ان دونوں میں خاص فرق کیا ہے؟ اس باب میں بچہ دانی میں ہونے والے ٹیومر کو بیان کیا گیا ہے جسے طبی اصطلاح میں یوٹیرائن فائبرائیڈ یا مائیوفائبروما یا ٹیومر کہتے ہیں۔

یہ ایک ایسا نسوانی مرض ہے جس کی پیچیدگی کی وجہ سے عورتوں کے ماں بننے کی راہ میں رکاوٹ پیدا ہوتی ہے۔ صرف یہی نہیں بلکہ اس سے مریضہ کی صحت ذہنی و جسمانی اعتبار سے بری طرح متاثر ہوتی ہے۔ لہذا اس مرض کی شروعات ہوتے ہی مریضہ کو ڈاکٹر سے صلاح و مشورہ کرنا چاہئے۔ سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ مریضہ کو کیسے اس بات کا علم ہوگا کہ بچہ دانی میں ٹیومر بننے کا عمل شروع ہو چکا ہے؟ اسی بات کو مد نظر رکھتے ہوئے ذیل میں چند علامتیں پیش کی جا رہی ہیں جو ٹیومر کی شروعات کی تنبیہ کرتی ہیں جس سے مریضہ کو ہوشیار ہو جانا چاہئے کہ بچہ دانی میں ٹیومر کے ہونے کا خطرہ لاحق ہو گیا ہے۔

اکثر یہ دیکھا گیا ہے کہ جن مریضاؤں کی بچہ دانی میں ٹیومر کی بیماری ہوتی ہے ان میں شروع شروع میں ایک علامت بہت ہی نمایاں ہوتی ہے۔ اور وہ ہے بچہ دانی سے خون کا بہنا۔ ماہواریوں سے خون کے بہنے کا تعلق ہوتا ہے۔ اکثر و بیشتر مریضاؤں میں خون کے بہنے کا عمل رک رک کر اور زیادہ مقدار میں دو ماہواریوں کے وقت اور

بچ کے وقفہ میں ہوتا رہتا ہے۔ خون کے زیادہ نکلنے سے مریضہ کے جسم میں پائے جانے والے ہیموگلوبین کی مقدار کافی حد تک گھٹ جاتی ہے۔ اس بات کی تصدیق مریضہ کے خون کی جانچ کرانے سے ہوتی ہے۔ درد کبھی کبھی مریضہ کی جاتکھوں تک پھیل جاتا ہے۔

دوسری علامت پیڑو میں درد کا ہونا ہے۔ جن مریضوں کی بچہ دانی میں ٹیومر ہوتا ہے ان میں اکثر یہ تکلیف پائی گئی ہے کہ ان کے پیڑو میں درد کا احساس ہوتا ہے۔ بالکل شروعات میں درد بیٹھا بیٹھا ہوتا ہے یا پھر کنکناہٹ کی طرح جوں جوں یہ مرض بڑھتا رہتا ہے ٹیومر کے سائز میں بھی آہستہ آہستہ اضافہ ہوتا رہتا ہے۔ ٹیومر کے بڑھنے سے درد میں بھی تیزی یعنی شدت آتی ہے۔ کبھی کبھی تو بعض مریضوں میں یہ دیکھا گیا ہے کہ وہ درد کی شدت کو برداشت نہیں کر پاتی ہیں۔

تیسری علامت ٹیومر کے حصے یعنی پیڑو میں بھاری پن کا احساس ہوتا ہے۔ اس مرض کی مریضہ اکثر یہی شکایت کرتی ہے کہ پیڑو میں کوئی بھاری چیز ہے۔ ایسا محسوس ہوتا ہے کہ جیسے کوئی وزنی شے سے دباؤ پڑ رہا ہو۔ چلتے وقت یہ احساس ہوتا ہے کہ کوئی چیز باہر کی طرف آرہی ہے۔ بیٹھنے اور لیٹ جانے سے یہ احساس ختم ہو جاتا ہے۔ کچھ مریضوں میں یہ بھی دیکھا گیا ہے کہ ٹیومر کے دباؤ کی وجہ سے اس کے ارد گرد پائے جانے والے وریدوں میں خون کا بہاؤ رک جاتا ہے جس کے سبب ان وریدوں سے تعلق رکھنے والے اعضاء کے ورید میں سوجن آ جاتی ہے۔ اگر اس ٹیومر کا دباؤ پیشاب لے جانے والی ٹی پر پڑتا ہے تو پیشاب کے اخراج میں رکاوٹ آتی ہے جس کے نتیجے میں مریضہ کے گردوں میں پیشاب بچنے لگتا ہے جس سے اسے ہائیڈرو نیہموسس کی بیماری میں مبتلا ہونے کا خدشہ لاحق ہو سکتا ہے۔ کچھ مریضوں میں ٹیومر کے دباؤ کا اثر پیشاب کی تھیلی میں دیکھا گیا ہے جس سے انہیں کو پیشاب کرتے وقت تکلیف ہوتی ہے۔ انہیں دباؤ کی وجہ سے پیدا ہونے والی علامتوں کا اثر ماہواری پر پڑتا ہے۔ یہی وجہ ہے کہ ماہواری بھی معمول کے مطابق نہیں ہوتی۔ اس کے برعکس یہ

تمام علامتیں ماہواری کے دوران کافی حد تک بڑھ جاتی ہیں۔ انہیں پیڑوں کے حصے میں ایک طرح کی بے چینی، کنکناہٹ، بھاری پن اور ایک طرح بیان نہ کی جانے والی گھبراہٹ جیسی کیفیت کا احساس ہوتا ہے۔ صرف یہی نہیں بلکہ دباؤ کی وجہ سے کچھ مریضوں کے ہمسکڑے اور دل بھی معمولی طبع پر متاثر ہوتے ہیں۔ لیکن ان کی تعداد بہت ہی کم ہے۔

سفید رقیق مادے کا اخراج یعنی دھات کا گرنا اس مرض کی تیسری علامت ہے۔ اس علامت کو بیشتر مریضائیں نظر انداز کر دیتی ہیں یا تو پھر اسے اہمیت ہی نہیں دیتیں۔ جس کی وجہ سے پیچیدگی دن بدن بڑھتی ہی جاتی ہے جس کا نتیجہ یہ ہوتا ہے کہ مریضہ کی صحت کافی متاثر ہوتی ہے جس کی تفصیلات پہلے پیش کی جا چکی ہیں۔

اس مرض کی مریضوں میں ماہواری کے وقت شدت کا درد ہوتا ہے جسے ڈیمینوریا کہتے ہیں۔ اس کی وجہ یہ ہے کہ ٹیومر کی وجہ سے بچہ دانی کے اس حصہ میں دباؤ پڑتا ہے جہاں ٹیومر ہوتا ہے۔ اس دباؤ کا اثر وہاں کے اعصاب پر پڑتا ہے جس سے درد کا احساس ہوتا ہے۔

اکثر آپ نے سنا ہوگا کہ فلاں عورت بانجھ ہے یا فلاں عورت کو بانجھ پن لی شکایت ہے۔ اس شکایت کی وجوہات میں سے ایک ان عورتوں کی بچہ دانی میں ٹیومر کا ہونا بھی ہے سو میں سے تمیں شادی شدہ عورتوں میں یہ دیکھا گیا ہے کہ ان کی بچہ دانی میں ٹیومر کے ہونے کی وجہ سے انہیں حمل نہیں ٹھہرتا جس کی وجہ سے ایسی عورتوں کو بچہ نہیں ہوتا۔ وہ ماں بننے کے قدرتی تحفے سے محروم رہتی ہیں جس سے انہیں کافی مایوسی اور ناامیدی کا سامنا کرنا پڑتا ہے یہاں تک کہ اس کی وجہ سے انہیں سرال والوں کے طعنے بھی سننے پڑتے ہیں۔ اگر ایسی مریضوں میں حمل ٹھہرتا بھی ہے تو بہت جلد حمل نقصان دہ بھی ہو جاتا ہے۔

آج کل فیملی پلاننگ کو اپنانے کے چکر میں بہت سی عورتیں بار بار حمل کو ضائع کر دیتی ہیں۔ بار بار اسقاط سے بچہ دانی بری طرح متاثر ہوتی ہے۔ ایسی عورتوں میں

کبھی کبھی یہ دیکھا جاتا ہے کہ بار بار حمل گروانے سے ان کی بچہ دانی میں ٹیومر ہو جاتا ہے اور اکثر و بیشتر ایسی عورتوں میں ٹیومر کے ہونے سے بہت ہی خطرناک صورت پیدا ہو جاتی ہے۔ بعد میں یہی ٹیومر بچہ دانی میں کینسر کا باعث بن جاتا ہے جو اپنے آپ میں ایک مملک مرض ہے۔ ایکسے اور دوسرے معاینے اس حالت کی تصدیق کرنے میں مددگار ثابت ہوتے ہیں۔

مندرجہ بالا باتوں کو مد نظر رکھتے ہوئے ایک بات صاف واضح ہو جاتی ہے کہ اس مرض کی شروعات میں پیدا ہونے والی علامتوں کو معمولی سمجھ کر نظر انداز نہ کریں بلکہ ان علامتوں پر خاص توجہ دیں اور عین وقت پر ہی ڈاکٹر سے رجوع کریں کیوں کہ اکثر یہ بات تجربے اور مشاہدے میں پائی گئی ہے کہ ایسی خواتین ان علامتوں کو توجہ دینے کے قابل ہی نہیں سمجھتیں۔ اگر علاج کرواتی بھی ہیں تو پورے دھیان کے ساتھ سلسلہ وار نہیں بلکہ جب تک تکلیف کی شدت تیز رہتی ہے تو دوا استعمال کرتی ہیں۔ کم ہوتے ہی علاج روک دیتی ہیں اور پھر انتظار میں رہتی ہیں کہ جب تکلیف بڑھے گی تو دیکھا جائے گا۔ ایسی باتوں سے مریضہ کو پرہیز کرنا چاہئے۔ مستقبل میں آپریشن سے بچنے کے لئے شروع ہی میں ہومیو پیتھی علاج کرائیں۔

چھٹا باب

استقاط حمل (ABORTION)

اور

خاندانی منصوبہ بندی (FAMILY PLANNING)

اس آخری باب میں استقاط حمل اور خاندانی منصوبہ بندی (یعنی قبل از وقت بچے کا رحم سے گرنا) اور فیملی پلاننگ سے منسلک تراکیب کے سلسلے میں چند اہم اور ضروری باتیں بطور معلومات پیش کی گئی ہیں۔ شادی شدہ خواتین کے لئے ان باتوں کی جانکاری نہایت ہی لازمی ہے۔ آج کے اس مشینی دور میں انسان کی دوڑ کی رفتار اتنی تیز ہو گئی ہے کہ بیشتر انسان جلد از جلد امیری کی بلندی کو چھونے اور کم وقفے میں آن، بان اور شان کے ساتھ زندگی گزارنے کے متمنی ہیں۔ اس لالچ میں پڑ کر انسان کا ذہن مکمل طور پر پیشہ ورانہ ہوتا جا رہا ہے۔ مادیت کی طرف ذہن کے جھکاؤ کی وجہ سے ڈاکٹری جیسا مقدس اور پاکیزہ پیشہ بھی آہستہ آہستہ بدنام ہونے لگا ہے اور اس بدنامی کے ذمے دار چند ایسے ڈاکٹر حضرات ہیں جو مریضہ اور ان کے رشتے داروں کی معصومیت اور لاعلمی سے فائدہ اٹھا کر ان کے کندھوں پر غیر ضروری اخراجات کا بوجھ لاد دیتے ہیں۔ اس طرح کا فعل طبی اصول کے بالکل خلاف ہے کیوں کہ اس طرح کسی مریضہ کے اعتماد کا گلا گھونٹنا ہے جو کہ نہیں ہونا چاہئے۔

بڑے افسوس کی بات ہے کہ آج کے اس مادی دور میں ایسے واقعات کی تعداد کم ہی صحیح مگر روز بہ روز رونما ہو رہے جو اکثر و بیشتر اخباروں میں شائع ہوتے ہی رہتے ہیں۔ جب کہ یہ ڈاکٹری جیسے مقدس پیشے کے لئے ایک دھبہ ہے۔ اس طرح کے غیر اخلاقی اور غیر طبی افعال میں اکثر ایسے ڈاکٹر حضرات ملوث پائے گئے ہیں جو یا تو سند یافتہ نہیں ہوتے یا پھر اس مرض کے ماہر ہی نہیں ہیں۔ لہذا علاج کے سلسلے میں

ان باتوں کا خیال رکھنا مریضہ اور ان کے والدین یا سرپرستوں کے لئے بے حد ضروری ہے۔ جس طرح ایک نا تجربہ کار اور اناڑی معمار ایک کمزور اور ناپائیدار عمارت تعمیر کر لیتا ہے، ٹھیک اسی طرح نا تجربہ کار اور غیر سند یافتہ طبیب کے ہاتھوں کبھی کبھی بھالی خواتین غیر ضروری پیچیدگیوں میں پھنس جاتی ہیں حتیٰ کہ بعض اوقات یہ بھی دیکھا گیا ہے کہ وہ تجربات کی بھیئت کی چڑھ جاتی ہیں۔ لہذا ہمیشہ اس بات کو ذہن نشین کر لیں کہ علاج کے سلسلے میں صحیح ڈاکٹر کا انتخاب کرنا بہت ہی اہم اور لازمی امر ہے۔

آج کل فیملی پلاننگ کے سلسلے میں ایک غلط افواہ یہ پھیلی ہوئی ہے کہ ایک ایسا انجکشن ایجاد ہوا ہے جس کے لگوا لینے سے پانچ سال تک کوئی حمل نہیں ٹھہرے گا۔ دوسری افواہ یہ گشت کر رہی ہے کہ ایک انجکشن لگوانے سے تین سال تک کوئی حمل نہیں ٹھہرے گا۔ اسی طرح کا ایک اور انجکشن ہے جس کے لگوا لینے سے سال تک کوئی بچہ نہیں ہوگا۔ یہ سب بے بنیاد اور فضول باتیں ہیں۔ لیکن بے چاری معصوم خواتین کیا جانیں کہ یہ سچ ہے یا غلط۔ وہ تو اپنے خاندان کی خوشحالی اور چھوٹی فیملی بنائے رکھنے کی چاہت میں ڈاکٹر کی ان باتوں پر سو فیصد اعتبار کر لیتی ہیں اور اس طرح اس ترکیب کو اپنائے رکھنے میں ہی عافیت سمجھتی ہیں۔ اسی لئے وہ بخوشی مندرجہ بالا انجکشن لگوانے پر آمادہ ہو جاتی ہیں تاکہ کم از کم پانچ سال یا تین سال یا پھر دو سال تک چھین و سکون کے ساتھ زندگی گزار سکیں اور روزانہ ٹابلیٹ کے استعمال سے بچ جائیں اور ایسے ٹابلیٹ کے استعمال سے ہونے والے برے اثرات سے نجات مل جائے۔ جب وہ اس قسم کے انجکشن لگوانے پر آمادہ ہو جاتی ہیں، تو پھر ان سے یہ کہا جاتا ہے کہ اس انجکشن کے لگوانے میں کافی تکلیف ہوگی اس لئے آپ کے اس حصے کو سن یعنی بے حس کر دیا جائے گا جس سے آپ کو اس انجکشن کی وجہ سے ذرا بھی تکلیف نہ ہوگی جب کہ حقیقت یہ ہے کہ حمل کو روکنے کے لئے کوپرٹی (Copper-T) شرم گاہ کے اندر پہنا دیا جاتا ہے۔ جس کے پہنانے میں نہ کوئی خاص تکلیف ہوتی ہے اور نہ زیادہ وقت لگتا ہے اور نہ ہی زیادہ خرچ آتا ہے۔ اس کوپرٹی کی آڑ میں انجکشن کا نام

لے کر مریض سے 500 روپے سے لے کر 1000 روپے تک وصول کر لیا جاتا ہے جب کہ اسی لائن کے کسی ماہر اور اسپیشلسٹ ڈاکٹر سے کوپرٹی لگوانے پر مشکل سے اور زیادہ سے زیادہ 300 روپے خرچ آتا ہے اور سرکاری اسپتالوں میں اور ہیلتھ سنٹروں میں تو مفت میں لگوانے کا انتظام رہتا ہے۔ جہاں تک کوپرٹی کی معیاد کی بات ہے تو اسے زیادہ سے زیادہ تین برسوں تک پہن کر رکھا جاسکتا ہے لیکن ہر دو سال کے بعد اسے بدلوالینا ہی بہتر ہے کیوں کہ اس مدت کے بعد اس کے عمل افادیت میں کمی آنے لگتی ہے۔ کوپرٹی کا استعمال کرنے والی خواتین کو چاہئے کہ اس کے لگوانے سے پہلی ماہواری کے بعد ڈاکٹر سے ضرور چیک اپ کروائیں کیوں کہ اکثر یہ دیکھنے میں آیا ہے کہ پہلی ماہواری میں کوپرٹی نکل آتا ہے۔ پہلی ماہواری کے بعد جب تیسری ماہواری ہو جائے تو اس کے بعد بھی جاکر ڈاکٹر سے چیک اپ کروالینا چاہئے۔ کوپرٹی پہننے والی عورتوں کو اس بات کا دھیان رکھنا چاہئے کہ کوپرٹی پہننے والی عورتوں کو اس بات کا دھیان رکھنا چاہئے کہ کوپرٹی سے منسلک دھاگا باہر کی طرف لٹکتا ہے کہ نہیں۔ اگر وہ باہر لٹک رہا ہو تو سمجھئے کہ کوپرٹی اپنی جگہ پر ٹھیک ہے اور حمل کے ٹھہرنے کا ڈر نہیں۔ اگر ماہواری رک جائے تو ڈاکٹر سے مشورہ لیں۔ کوپرٹی کے لگوانے سے برے اثرات بھی دیکھے جاتے ہیں۔ اکثر یہ بات تجربے اور مشاہدے کے بعد سامنے آئی ہے کہ کوپرٹی لگوانے والی یعنی پہننے والی عورتوں کی اندام نہانی سے غیر معمولی خون کا آنا شروع ہو جاتا ہے۔ کچھ عورتوں میں خون زیادہ بہتا ہے تو کچھ میں کم۔ بعض عورتوں میں یہ دیکھا گیا ہے کہ کوپرٹی پہننے کے بعد سے معمولی مقدار میں خون یا پتلا رقیق مادہ ماہواری کے شروع ہونے تک رستا رہتا ہے۔ اگر خون کافی اور لگاتار بہتا رہے تو فوراً ڈاکٹر سے جاکر رجوع کریں۔ ایسی حالت میں ڈاکٹر کوپرٹی یعنی لوپ کو نکال دیتے ہیں۔ بعض عورتوں میں لوپ لگوانے کے بعد کمر، پیٹھ، پیڑو اور جانگھ میں درد کا احساس ہوتا ہے جو کچھ دنوں کے بعد غائب ہو جاتا ہے۔ کچھ عورتوں میں سفید دھات خارج ہونے لگتا ہے۔ بہت کم عورتوں کے پیڑو کے اندرونی حصوں میں میں

انفیکشن دیکھا گیا ہے۔ لوپ کی وجہ سے کچھ عورتوں کی بچہ دانی میں چھید ہو جاتا ہے مگر اس کی تعداد بہت ہی کم ہے۔ کبھی کبھی لوپ کے ٹیل ہونے سے بچہ دانی سے منسلک ٹیوب میں حمل ٹھہرنے کا خدشہ رہتا ہے جو اپنے آپ میں اس عورت کے لئے خطرہ لاحق ہو سکتا ہے اگر اس قسم کا حمل ٹھہر جاتا ہے تو آپریشن کر کے حمل کو ضائع کرنا لازمی ہو جاتا ہے۔

جہاں تک حمل کو ضائع کرانے کی بات ہے تو اس سلسلے میں چند ضروری باتوں کا جاننا ہر عورت خا مکہ شادی شدہ عورت کا جاننا ایک لازمی ہے۔ ابورشن یعنی حمل کو ضائع کروانا آج کل بہت عام ہو گیا ہے۔ عام عورتوں کا یہ خیال ہے کہ حمل کے نقصان کروانے سے کوئی برا اثر جسم پر نہیں پڑتا اور اسی غلط فہمی کی وجہ سے سلسلہ وار پانچ چھ بار حمل گروالیتی ہیں جس کا نتیجہ بڑا ہی بھیانک ہوتا ہے۔ نہ جانے کتنی عورتیں اب تک اس کی بھیٹ چڑھ چکی ہیں۔ بار بار حمل گروانا صحت کے ساتھ ساتھ زندگی کے لئے بھی خطرہ ہے۔ کچھ عورتیں اس قدر عادی ہو جاتی ہیں کہ پانچ پانچ مہینے یہاں تک کہ چھ چھ مہینے تک کے حمل گروالیتی ہیں جو کہ قانوناً، شرعاً اور اصول زندگی کے خلاف فعل ہے۔ اس زمرے میں دو قسم کی عورتیں پائی جاتی ہیں۔ پہلی قسم کی عورتیں اپنی مرضی سے اس غیر قانونی کام کو کرواتے ہیں اور دوسری قسم کی عورتیں وہ ہیں جو اپنے شوہروں کے ظلم و ستم کی شکار ہوتی ہیں یا پھر ناجائز تعلقات کے نتائج میں مجبور ہو جاتی ہیں۔ اکثر و بیشتر ایسی عورتوں کے نتائج برے اور بڑے بھیانک دیکھے گئے۔ بار بار حمل کے نقصان کروانے سے بچہ دانی کی دیواریں کمزور پڑ جاتی ہیں۔ بچہ دانی میں ٹیو مر اور ورم ہو جاتے ہیں۔ یہاں تک کہ ایسی عورتوں کو مستقبل میں بچہ دانی یا اندام نہانی کا کینسر ہونے کا خطرہ رہتا ہے۔ میڈیکل رپورٹ سے پتہ چلتا ہے کہ بہت سی عورتوں کی موت اسی وجہ سے ہوئی ہے۔

آج کل بہت سی عورتیں ٹیلی پلاننگ کے معاملے میں کوئٹرا سپٹم پل یعنی حمل روکنے کے ٹابلیٹ کا استعمال کرتی ہیں جسے روزانہ اور لگاتار بغیر روکے ہوئے کھانا

پڑتا ہے۔ اس ٹابلیٹ کے استعمال سے حمل کو روکا جاسکتا ہے لیکن زیادہ عرصہ تک اس کا استعمال مریض کی صحت پر اثر انداز ہو سکتا ہے بعض مریضوں کی ہسٹری لیتے وقت یہ دیکھنے کو ملا ہے کہ کوئی پانچ پانچ سال تک تو کوئی دس دس سال کے وقفہ پر اس ٹابلیٹ کا استعمال کئے جا رہی ہیں جس سے ان کی صحت بری طرح متاثر ہوئی ہے۔ مانع حمل کے لئے استعمال کئے جانے والے ٹابلیٹ سے عورتوں میں کچھ برے اثرات پائے گئے ہیں مثلاً خون کا بہنا، چھاتی میں دودھ کے بننے میں کمی آجانا، چھاتی میں بھاری پن اور درد کا احساس ہونا، جسم کا وزن بڑھ جانا، دل کے امراض میں جھٹلا ہونا، بلڈ پریشر کا بڑھ جانا، پیٹ کا پھولنا اور پیٹ میں مروڑ ہونا، بدن پر دانے یا الرجی کا ہونا، اندام نہانی میں انفیکشن کا ہونا۔ آنکھ میں کیٹاریکٹ کا ہونا، بھوک میں کمی ہونا، پیشاب کے راستے میں تکلیف کا ہونا، سر میں درد اور چکر کا آنا، سر کے بالوں کا گرنا، وغیرہ وغیرہ۔ لمبے عرصہ تک اس کے استعمال سے چھاتی یعنی بریسٹ کینسر ہونے کا خطرہ لاحق رہتا ہے۔

اس قسم کے ٹابلیٹ کے استعمال سے پہلے عورتوں کو ڈاکٹر سے پوری طرح چیک اپ کروالینا چاہئے کیوں کہ اگر جسم میں کوئی بڑا مرض ہو تو اس ٹابلیٹ کے استعمال سے بہت بڑا خطرہ لاحق ہو سکتا ہے۔ دل کے مریضوں کو اس قسم کے ٹابلیٹ سے پرہیز کرنا چاہئے۔ جو عورتیں سگریٹ پیتی ہیں (جو کہ خود صحت کے لئے مضر ہے) یا جن کو ہائی بلڈ پریشر یا شوگر کی بیماری یا خون میں تھپی کی زیادتی کی بیماری یا موٹاپے کی شکایت ہو تو انہیں اس طرح کے ٹابلیٹ سے گریز کرنا چاہئے کیوں کہ اس ٹابلیٹ کے استعمال سے امراض قلب یعنی دل کی بیماریوں میں جھٹلا ہونے کا خطرہ لاحق ہو سکتا ہے۔ اگر اس قسم کے ٹابلیٹ کے استعمال کے دوران آنکھ کا مرض ہو جائے تو اسے فوراً روک دینا چاہئے کیوں کہ اس وقت اس ٹابلیٹ کے استعمال سے آنکھ کی بینائی پر اثر پڑ سکتا ہے۔ جن عورتوں میں جگر یا پتہ (یعنی لیور یا گال بلاڈر) کی بیماری ہو، انہیں اس قسم کے ٹابلیٹ کے استعمال سے پرہیز کرنا چاہئے کیوں کہ ایسی عورتوں میں اس

ٹابلیٹ کے استعمال سے پرہیز کرنا چاہئے کیوں کہ ایسی عورتوں میں اس ٹابلیٹ کے استعمال سے پت کی تھیلی میں پتھری کا مرض دیکھا گیا ہے۔ زچگی کے بعد عورتوں کو اس ٹابلیٹ کا استعمال نہیں کرنا چاہئے کیوں اس سے چھاتی سوکھنے لگتی ہے اور دودھ کا بننا کم ہو جاتا ہے اور کئی بار ذرا بھی دودھ نہیں بنتا جس کی وجہ سے نوزائیدہ بچہ ایک قدرتی تحفہ یعنی ماں کے دودھ سے محروم ہو جاتا ہے۔ ایسی حالت میں ہومیو پیتھی دوائیں بڑی مفید اور کار آمد ثابت ہوتی ہیں۔

قصہ کوتاہ، فیملی پلاننگ کے سلسلے میں مندرجہ بالا باتوں کو دھیان میں رکھنا بے حد ضروری ہے۔

دوسرا حصہ

دوا گھر عالم طبیب
دہلی

تکلیف دہ ماہواری کے ہومیوپیتھک معالجات

HOMOEOPATHIC THERAPEUTICS OF (DYSMENORRHEA)

ایکونائی ٹم نیپلس (ACONITUM NAPELLUS)

ماہواری کے شروع ہوتے ہی پیڑو کے دائیں حصے میں چھن کے ساتھ درد ہوتا ہے جو بہت تیز اور تیر کے زخم کے جیسا محسوس ہوتا ہے۔ وضع حمل کی مانند پیڑوں میں دباؤ سا محسوس ہوتا ہے۔ درد کے ساتھ مریضہ کو خبطی طاری ہوتی ہے اور ہر وقت اس کے ذہن و دماغ میں ایک طرح کا خوف و ڈر سا محسوس ہوتا رہتا ہے۔ وہ ہر وقت بے چین اور کراہتی رہتی ہے اور اس طرح وہ بہت گھبرانے لگتی ہیں۔ اسے شدت کی پیاس محسوس ہوتی ہے۔ بار بار زیادہ مقدار میں ٹھنڈا پانی پیتی رہتی ہے لیکن پھر بھی پیاس نہیں بجھتی۔ ماہواری کے دوران خون بالکل سرخ نکلتا ہے اور کافی مقدار میں گرتا ہے۔ کچھ دنوں تک ماہواری ہوتی ہی رہتی ہے۔ ماہواری کے ساتھ ناک سے خون بھی بہتا ہے جس کی وجہ سے مریضہ کی ذہنی الجھن اور خوف و ڈر میں اور بھی اضافہ ہوتا ہے۔ ایسی مریضہ راستے میں اکیلے چلنے یا راستہ پارک کرنے اور بھیڑ میں جانے سے ڈرتی ہے۔ اسے گیت اور شگیت بالکل ہی پسند نہیں۔ ہوتا اسے 30 اور 200 پوٹینسی میں استعمال کریں

ایلیٹرس فیری نوسا (ALETRIS FARINOSA)

ایسی مریضہ میں خون کی کمی ہوتی ہے۔ اس لئے وہ ہر وقت تھکی تھکی سی اور ست دکھائی دیتی ہے۔ جن لڑکیوں میں ماہواری قبل از وقت شروع ہوتی ہے اور درد کی شدت برداشت کی حد سے تجاوز کرنے لگتی ہے، ان کے لئے یہ دوا بہت ہی کارگر ثابت ہوتی ہے۔ ماہواری کافی مقدار میں ہوتی ہے۔ پیڑو کے حصے میں بھاری پن کا احساس ہوتا ہے۔ عورتوں میں ماہواری کے وقت وضع حمل جیسا درد ہوتا ہے اور ساتھ ہی ساتھ یہ بھی احساس ہوتا ہے کہ جیسے پچہ دانی باہر کی طرف نکلتی چلی آرہی ہے۔ بعض مریضوں میں یہ بھی دیکھا گیا ہے کہ ماہواری رک رک کر اور کم مقدار میں ہوتی ہے۔ اس دوا کی افادیت ٹنچر (Q) اور 3 X پوٹینسی میں اچھی پائی گئی ہے۔

ایمونی یم کاربونیکم (AMMONIUM CARBONICUM)

ماہواری وقت سے پہلے اور کافی مقدار میں ہوتی ہے۔ ماہواری شروع ہونے سے پہلے پیٹ میں کافی مروڑ دیکر دست ہوتا ہے اور بھوک بالکل ختم ہو جاتی ہے حتیٰ کے کھانے کی خواہش بھی نہیں ہوتی۔ خون جما ہوا اور کالا ہوتا ہے درد کے ختم ہوتے ہی خون کا بہنا بھی بند ہو جاتا ہے۔ دوران حیض درد کے ساتھ ساتھ تھکاوٹ (خاص کر جانگھوں میں) دانت میں درد اور چہرے پر ایک طرح کی اداسی معلوم پڑتی ہے۔ اس وقت مریضہ کو جھمائی بھی خوب آتی ہے۔ اس کے علاوہ اسے ٹھنڈے پن کا بھی احساس ہوتا ہے۔ یوں تو دیکھنے میں اس قسم کی مریضہ کجیم و سچیم ہوتی ہے مگر بہت جلد تھک جاتی ہے اور ان سے سردی بھی بہت جلد لگ جاتی ہے۔ یہ دوا 30 اور 200 پوٹینسی میں استعمال کریں۔

بیلادونا (Belladonna)

ماہواری کے شروع ہونے سے پہلے پیڑو میں درد ہوتا ہے۔ اس درد کی سب

سے بڑی خاصیت یہ ہے کہ درد اچانک ہوتا ہے اور پھر اچانک ہی غائب ہو جاتا ہے۔
 درد کافی شدت کے ساتھ ہوتا ہے۔ ایک کو لھے سے دوسرے کو لھے میں درد پھیلتا رہتا
 ہے۔ ماہواری کے وقت دونوں چھاتیوں میں بھاری پن کا احساس ہوتا ہے۔ سر میں
 بھی بھاری پن کا احساس ہوتا ہے اور چہرہ سرخ ہو جاتا ہے۔ خون کا رنگ بالکل سرخ
 ہوتا ہے اور کافی مقدار میں خون خارج ہوتا ہے۔ دوران حیض مریضہ کو ایسا احساس
 ہوتا ہے کہ جیسے اس کے پیٹ میں اندرونی اعضاء پیشاب کے راستے باہر کی طرف
 آرہے ہوں۔ وہ ذہنی طور پر کچھ چڑچڑی ہو جاتی ہے اس لئے ذرا ذرا سی بات پر لوگوں
 کو کانٹنے کے لئے دوڑتی ہے اور چیزوں کو توڑنے پھوڑنے لگتی ہے جبکہ نارمل حالت
 میں بالکل ہی شگفتہ مزاج اور بالکل ہنس مکھ ہوتی ہے۔ 30 اور 200 پوٹینسی میں
 استعمال کرنے سے خاطر خواہ نتیجہ برآمد ہوتا ہے۔

بویسٹا (BOVISTA)

ماہواری سے قبل اور دوران ماہواری مریضہ کو دست ہوتا ہے۔ وقت سے
 پہلے ہی ماہواری ہو جاتی ہے اور کافی مقدار میں ہوتی ہے۔ پیڑو کے نیچے درد ہوتا ہے
 اور خون کا رنگ سرخ ہوتا ہے۔ رات کے وقت ماہواری میں تیزی آ جاتی ہے۔ کر
 کے گرد زیادہ سے کپڑا باندھنے سے وہ برداشت نہیں کپاتی۔ اس قسم کی مریضہ اگر
 بولنے میں تو تلتاتی ہو تو اس کی تشخیص میں یہ ایک مثبت علامت سمجھی جاتی ہے۔ اسے
 30 پوٹینسی یعنی پاور میں استعمال کرنے پر خاطر خواہ نتیجہ ملتا ہے۔ یہ 200 پوٹینسی
 میں بھی استعمال کی جاتی ہے۔

کیکٹس گرانڈی فلورس (Cactus Grandiflorus)

ماہواری وقت سے پہلے یا پھر وقت پر ہوتی ہے لیکن اس کی مقدار بہت ہی کم
 ہوتی ہے۔ زیادہ تر یہ دیکھا گیا ہے کہ دو سے تین دن تک ماہواری جاری رہتی ہے۔

درد میں اتنی شدت ہوتی ہے کہ مریضہ برداشت نہیں کھاتی ہے۔ درد سے کراہنے لگتی ہے۔ یہاں تک کہ رو پڑتی ہے۔ درد کی شدت ایک خاص وقت یعنی شام کو بڑھتی ہے۔ ماہواری کے دوران خارج ہونے والے خون کا رنگ کالا اور بالکل پیچ جیسا ہوتا ہے۔ سونے سے یا لیٹ جانے سے خون کا گرنا بند ہو جاتا ہے۔ سینے کے بائیں جانب یہ احساس ہوتا ہے کہ جیسے دل میں کھینچاؤ ہو رہا ہو۔ ایسی مریضہ اگر بائیں کروٹ میں سونا چاہتی ہو تو اسے اختلاج قلب کی شکایت ہونے لگتی ہے۔ اس دوا کو مدر ٹنچر '3x' اور 200 پوٹینسی میں استعمال کریں۔

کیلکیریا کاربونیکا (CALCAREA CARBONICA)

یہ دوا ان لڑکیوں کے لئے بہت ہی مفید ثابت ہوئی ہے جن کو پہلی ماہواری کم عمر میں ہی آجاتی ہے۔ ماہواری ہونے سے پہلے رات میں کافی درد ہوتا ہے۔ دونوں چھاتیوں میں بھاری پن کا احساس ہوتا ہے۔ سر درد اور ٹھنڈی سا محسوس ہوتا ہے۔ ماہواری کافی مقدار میں ہوتی ہے۔ کبھی کبھی تو کم بھی ہوتی ہے یا دب کر رہ جاتی ہے۔ خون کا رنگ بالکل سرخ ہوتا ہے جو کافی دنوں تک بہتا ہے۔ پیڑوں میں ایسا درد ہوتا ہے کہ جیسے کوئی کاٹ رہا ہو۔ ماہواری کے دوران پاؤں بالکل سرد اور نم ہو جاتے ہیں۔ سر کے اوپری حصے میں دوران خون بہت تیز ہو جانے سے گرمی کا احساس ہوتا ہے۔ بعض مریضوں کو چکر آنے لگتا ہے اور کبھی کبھی تو مہلی کے ساتھ الٹی بھی ہو جاتی ہے۔ جب ماہواری ختم ہوتی ہے تو پیڑوں میں ہلکی سی چیبن محسوس ہوتی ہے۔ ایسی مریضہ بہت جلد ٹھنڈ سے متاثر ہوتی ہے۔ وہ جسمانی طور پر موٹی ہوتی ہے۔ اندھا اسے بہت پسند ہوتا ہے۔ اسے پینہ بھی کافی آتا ہے۔ اس کی ایک علامت بہت ہی عجیب و غریب ہوتی ہے۔ یہ وہ ہے کہ اسے قبض کی شکایت ہوتی رہتی ہے مگر اس حالت میں وہ اپنے آپ کو بہتر محسوس کرتی ہے جب کہ عام بات یہ ہے کہ پانخانہ نہ ہونے سے طبیعت اچھی نہیں لگتی۔ کیلکیریا کاربونیکا اور بیلادونا میں ایک گہرا رشتہ

ہے۔ اگر کسی مریضہ کو بیلاڈونا دی گئی ہو تو اسے پوری طرح شفا یاب ہونے کے لئے کیکلیریا کاربونیکا دینی پڑی گی۔ مگر اس دوا کے استعمال میں یہ احتیاط ضرور برتنی کہ اسے بہت جلد جلد نہ دھرائیں۔ 200'30 اور 1M کی پوٹینسی میں استعمال کریں

کاؤلوفائی لم (CAULOPHYLLUM)

پیٹ میں کھینچاؤ پیدا ہوتا ہے۔ پیڑوں میں رک رک کر دوروں کی طرح درد ہوتا ہے جسے برداشت کرنا مشکل ہوتا ہے۔ یہ درد ہر سمت پھیل جاتا ہے یعنی پیڑوں سے دوسرے اعضاء میں بھی یہ درد پھیلتا ہے۔ کافی مقدار میں ماہواری ہوتی ہے۔ 30'Q اور 200 پوٹینسی میں استعمال کریں۔

کیومیلا (CHAMOMILLA)

کالے رنگ کا جما ہوا خون ماہواری میں خارج ہوتا ہے جو کافی مقدار میں گرتا ہے۔ پیڑوں کے حصے میں دباؤ اور درد محسوس ہوتا ہے جو بالکل وضع حمل جیسا محسوس ہوتا ہے۔ درد سے دونوں جانگھیں پھٹنے لگتی ہیں۔ ماہواری کے دوران بار بار پیشاب کی حاجت محسوس ہوتی ہے۔ مریضہ کا ایک گال سرخ تو دوسرا پیلا دکھائی پڑتا ہے۔ کافی پسینہ آتا ہے جو گرم رہتا ہے۔ ایسی مریضہ تکلیف برداشت کرنے کے قابل نہیں ہوتی، اسی لئے بہت جلد غصہ اور چڑچڑاہٹ کا اظہار کرتی ہے یہاں تک کہ لوگوں کو مارنے پر اتر آتی ہے۔ اسے 30 اور 200 پوٹینسی میں استعمال کریں۔

سیسی سی فیوگارسی موسا (Cimicifuga Racemosa)

ماہواری شروع ہونے سے پہلے ہی درد شروع ہو جاتا ہے۔ پیڑوں میں درد کا احساس ہوتا ہے۔ درد ایک کولھے سے دوسرے کولھے تک پھیلتا ہے۔ بعض دفعہ درد ناف کی طرف اٹھتا ہے۔ کبھی کبھی یہی درد پیڑوں سے شروع ہو کر دونوں جانگھوں کے

سامنے کے حصے میں اتر آتا ہے۔ اس درد کی بڑی خاصیت یہ ہے کہ جیسے جیسے ماہواری تیز ہوتی ہے، درد بھی اسی شدت کے ساتھ بڑھنے لگتا ہے۔ دوران حیض کافی مقدار میں خون خارج ہوتا ہے۔ خون کا رنگ کالا ہوتا ہے جو جھے ہوئے ٹکڑوں کی مانند ہوتا ہے جس میں کافی بدبو بھی ہوتی ہے۔ ایسی مریضہ کے کمر میں بھی درد رہتا ہے۔ اس میں اعصابی کمزوری اس قدر ہوتی ہے کہ بہت جلد گھبرا جاتی ہے۔ ذہنی طور پر بہت افسردہ ہوتی ہے اور بند گاڑی میں سواری کرنے سے ڈرتی ہے۔ اگر مریضہ کے جوڑوں کا بھی درد ہوتا ہو تو یہ علامت اس دوا کی تشخیص کے لئے مثبت اہمیت کے مترادف ہوتی ہے۔ ایسی مریضہ میں حیض ٹھیک وقت پر نہیں ہوتا ہے۔ 6'30 اور 200 پوٹینسی استعمال کریں۔ اس دوا کا دوسرا نام ایکٹیا رسی موسا (ACTAEA RACEMOSA) ہے۔

کوک کیولس انڈیکس (COCCULUS INDICUS)

درد کے ساتھ ماہواری ہوتی ہے جو وقت سے پہلے ہی شروع ہو جاتی ہے۔ ماہواری میں خارج ہونے والا مادہ بالکل کالا ہوتا ہے جو کافی مقدار میں آتا رہتا ہے۔ درد شدت کے ساتھ مگر رک رک کر ہوتا رہتا ہے جو برداشت کی حد کو پار کر جاتا ہے۔ ماہواری کے دوران اتنی کمزوری ہو جاتی ہے کہ مریضہ مشکل سے کھڑی ہو پاتی ہے۔ ایسی مریضہ ذہنی طور پر پریشان اور کم عقل ہوتی ہے۔ بہت جلد جلد باتیں کرتی ہے اور اپنی مخالفت کسی بھی طرح برداشت نہیں کر پاتی۔ ایسی مریضہ میں ایک علامت بہت ہی انوکھی ہوتی ہے۔ وہ یہ کہ اگر وہ کسی گاڑی یعنی بس ٹیکسی یا پھر کشتی یا اسٹیمر میں سفر کرتی ہے تو اسے متلی اور قے ہونے لگتی ہے۔ اسے 6'30 اور 200 کی پوٹینسی میں استعمال کریں۔

کونائیم میکو لیٹم (CONIUM MACULATUM)

ماہواری شروع ہونے سے قبل دونوں چھاتیاں سوج جاتی ہیں جس سے مریضہ بھاری پن، سخت اور درد محسوس کرتی ہے۔ ماہواری سے قبل چہرے پر دانے نکل آتے ہیں۔ ماہواری دیر سے اور بہت کم ہوتی ہے۔ خون چاکلیٹی رنگ کا ہوتا ہے۔ پیڑوں میں دباؤ سا محسوس ہوتا ہے اور درد دونوں پاؤں تک پھیلتا ہے۔ ماہواری کے دوران پیشاب کرنے میں تکلیف محسوس ہوتی ہے۔ پیشاب رک جاتا ہے اور پھر دوبارہ شروع ہوتا ہے۔ دل کے حصے میں درد سا محسوس ہوتا ہے اور سونے سے چکر آنے لگتا ہے۔ حتیٰ کے لیٹنے کی حالت میں سر گھمانے سے بھی سر میں چکر آتا ہے۔ ایسی مریضہ کو اکیلے میں گھبراہٹ ہوتی ہے مگر لوگوں سے ملنا بھی پسند نہیں کرتی۔ غیر شادی شدہ عورتوں، یواؤں اور ان لڑکیوں میں جو جنسی جذبات کا حد سے زیادہ استعمال کرتی ہیں، ان کے لئے یہ دوا بہت مفید ثابت ہوئی ہے۔ اسے 30'6 اور 200 میں پوٹینسی استعمال کریں۔

جیلیسیم (GELSEMIUM)

ماہواری سے قبل سر میں درد، الٹی، پیڑوں میں درد، کمر اور دونوں پاؤں میں درد ہوتا ہے۔ چہرہ سرخ ہو جاتا ہے۔ ایسا احساس ہوتا ہے کہ بچہ دانی کو کوئی ہاتھ سے پکڑ کر زور سے دبا رہا ہو۔ ماہواری کے دوران آواز بالکل بھاری ہو جاتی ہے۔ اور حلق میں درد بھی ہوتا ہے۔ مریضہ کو پیاس نہیں لگتی۔ ماہواری بہت ہی کم ہوتی ہے۔ اس دوا کو 30'3 اور 30 پوٹینسی میں استعمال کریں

گوسی ٹینیم ہربیسیم (GOSSYPIUM HERBAEUM)

مریضہ کو ماہواری شروع ہونے کا احساس ہوتا رہتا ہے لیکن ماہواری ہوتی ہے، نہیں اگرچہ ماہواری کا وقت بھی ہو جاتا ہے۔ اس احساس کے ساتھ پیڑوں میں درد بھی

ہوتا ہے۔ درد کے ساتھ بھاری پن محسوس ہوتا ہے ماہواری بہت ہی قلیل مقدار میں ہوتی ہے جو بالکل پانی جیسی ہوتی ہے۔ ایسی خواتین اکثر بیشتر دراز قد ہوتی ہیں جن میں خون کی کمی پائی جاتی ہے اور بہت جلد گھبرانے والی ہوتی ہیں۔ اسے مدر ٹنگر (Q) اور 6X پوٹینسی میں استعمال کریں۔

گرافیٹس (Graphites)

ماہواری کے وقت پیٹ کے نچلے حصے میں بہت زور کا درد ہوتا ہے۔ ساتھ ساتھ کلیجے کے پاس بھی درد ہوتا ہے۔ اس کے علاوہ آواز کا بھاری ہونا، سردی کا ہونا، کھانسی اور پسینہ کا ہونا اور متلی کا احساس خاص کر صبح کے وقت ہونا، یہ سب علامتیں ماہواری کے دوران پائی جاتی ہیں۔ ماہواری ٹھیک وقت پر نہیں ہوتی اور اگر ہوتی ہے تو ایک دن یا زیادہ سے زیادہ دو دن تک جاری رہتی ہے۔ ماہواری میں خارج ہونے والے مادے کا رنگ ہلکا پیلا ہوتا ہے۔ ماہواری سے پہلے اور اس کے بعد مریضہ کو لیکوریا کی شکایت بھی رہتی ہے۔ اس دوا کو 30 اور 200 پوٹینسی میں استعمال کریں۔

لیک کینائی نم (LACCANINUM)

قبل از وقت ماہواری شروع ہو جاتی ہے اور کافی مقدار میں ہوتی ہے۔ خون بالکل سرخ ہوتا ہے جو لیدار اور ڈوری جیسا ہوتا ہے۔ ماہواری کے دوران پیٹ کے بائیں حصے میں شدت کا درد ہوتا ہے جو ایک طرف سے دوسری طرف پھیلتا رہتا ہے۔ اس درد کی خاصیت یہ ہے کہ ماہواری کے شروع ہوتے ہی درد کی شدت میں کمی آ جاتی ہے (جیسا کہ لیکیس اور زکم مینا لیکم میں یہی علامت پائی جاتی ہے)۔ ماہواری کے ساتھ حلق میں درد ہوتا ہے جو ماہواری کے ختم ہوتے ہی غائب ہو جاتا ہے۔ اس دوا کو 200 اور 1 M کی پوٹینسی میں استعمال کریں اور بار بار دہرانے

سے گریز کریں۔

لیلیم ٹیگرینم (LILIUM TIGRINUM)

پیڑوں کے بائیں حصے میں درد شروع ہوتا ہے جہاں سے یہ پورے پیڑوں میں پھیل جاتا ہے۔ پھر پیڑ سے کاچھ میں پھیلتا ہوا پاؤں تک آجاتا ہے۔ حیض وقت سے پہلے شروع ہو جاتا ہے مگر بہت ہی قلیل مقدار میں ہوتا ہے جو دیکھنے میں بالکل کالا، جما ہوا اور بدبودار ہوتا ہے۔ صرف چلنے پھرنے سے ہی اس طرح کا اخراج ہوتا رہتا ہے۔ آرام کی حالت میں ماہواری کا گرنا رک جاتا ہے۔ ماہواری کے وقت پاخانے کی حاجت محسوس ہوتی ہے۔ اس کے علاوہ مریضہ کو ایسا احساس ہوتا ہے کہ پیٹ کے تمام اعضاء نکل کر باہر کی طرف چلے آ رہے ہوں۔ اسی لئے مریضہ ایک پاؤں کے اوپر دوسرے پاؤں کو چڑھا کر بیٹھتی ہے۔ تاکہ اعضاء باہر نہ آسکیں۔ ایسی مریضہ میں ہمیشہ جلد بازی اور پریشانی کی کیفیتیں پائی جاتی ہیں۔ ان میں جنسی خواہشات حد درجہ پائی جاتی ہیں۔ انہیں گوشت کھانے میں اچھا لگتا ہے۔ اس دوا کو 30 اور 200 کی پوٹنسی میں استعمال کریں۔

میگنیشیا کاربونیکا (MAGNESIA CARBONICA)

ماہواری ہمیشہ دیر سے شروع ہوتی ہے جس کی مقدار بھی بہت قلیل ہوتی ہے۔ خون کا رنگ کالا بالکل پیچ کی مانند ہوتا ہے اور جسے دھونا بہت مشکل ہوتا ہے کیوں کہ کپڑے سے اس کے رنگ کو ہٹانے میں بہت مشکل کا سامنا کرنا پڑتا ہے یعنی بہت جلدی اور آسانی سے اس کا داغ نہیں ہٹتا۔ ماہواری سے پہلے حلق میں درد، سردی اور ناک بند ہو جاتی ہے۔ ماہواری کے دوران وضع حمل کی مانند درد ہوتا ہے۔ ایسا احساس ہوتا ہے کہ جیسے پیٹ کے اندر کوئی چھری سے کاٹ رہا ہو۔ ساتھ ہی ساتھ پیٹھ میں بھی درد ہوتا ہے۔ اس کے علاوہ مریضہ کو ٹھنڈک اور کمزوری بھی محسوس ہوتی ہے۔

ماہواری کی سب سے بڑی خصوصیت یہ ہے کہ صرف رات کے وقت سونے سے یا پھر لیٹنے سے ہوتی ہے اور چلنے پھرنے سے رگ جاتی ہے۔ اس دوا کو 30 اور 200 پوٹینسی میں استعمال کریں۔

میگنیشیا فاسفوریکا (MAGNESIA PHOSPHORICA)

یہ ایک بائیو کیمک دوا ہے جس کا اثر جلدی ہوتا ہے۔ اگر اسے ہومیوپیتھی کی ہیرل گن کہا جائے تو بے جا نہ ہوگا کیوں کہ اس کے استعمال سے مریضہ کو ماہواری کے دوران ہونے والی درد کی شدت سے چند لمحوں میں آرام مل جاتا ہے۔ درد کی شدت سے مریضہ پاگل ہو جاتی ہے۔ آرام کے لئے ایک جگہ سے دوسری جگہ تبدیل کرتی رہتی ہے۔ درد پیٹ کے داہنے حصے میں ہوتا ہے۔ اس جگہ کو زور سے دبائے رکھنے اور سامنے کی طرف جھک کر بیٹھنے سے کچھ آرام ملتا ہے یا پھر بوتل میں گرم پانی بھر کر اسے کپڑے سے لپیٹ کر درد کی جگہ پر رکھنے سے درد میں کچھ کمی آتی ہے۔ درد ہمیشہ ماہواری سے ایک یا دو روز قبل ہی شروع ہو جاتا ہے اور ماہواری کے شروع ہوتے ہی درد میں کمی آنے لگتی ہے۔ ماہواری میں خارج ہونے والا خون کالا اور ڈوری جیسا ہوتا ہے۔ اسے 6X ٹابلیٹ کی شکل میں استعمال کریں۔ سہم گرم پانی میں ڈال کر استعمال کرنے سے بہت جلد آرام ملتا ہے۔

پلساٹیلانگر یکنس (PULSATILLA NIGRICANS)

ماہواری اکثر و بیشتر اپنے مقررہ وقت کے گزر جانے کے بعد ہوتی ہے۔ تجربے سے اکثر دیکھا گیا ہے کہ ٹھیک وقت کے چار پانچ دنوں کے گزرنے کے بعد ماہواری شروع ہوتی ہے اور وہ بھی زیادہ دنوں تک جاری نہیں رہتی بلکہ دو تین دنوں کے بعد ہی بند ہو جاتی ہے جس کی مقدار بھی نہایت ہی معمولی سی ہوتی ہے۔ اس کی نوعیت اور رنگت میں تبدیلی آتی رہتی ہے۔ کبھی تو یہ گاڑھے کالے رنگ کی ہوتی ہے۔ تو

کبھی خون کے جے ہوئے تھکے کی مانند اور کبھی بالکل پانی جیسی ہو۔ یہ دن کے وقت اور چلتے پھرنے سے زیادہ ہوتی ہے۔ ماہواری کی ایک خصوصیت یہ بھی ہے کہ خون کا بہنا اچانک بند ہو جاتا ہے۔ اور پھر دوبارہ بہنا شروع ہو جاتا ہے۔ ماہواری کے ساتھ کمر اور پیٹھ میں کافی درد ہوتا ہے، جسے مریضہ برداشت نہیں کر پاتی ہے۔ وہ اس درد کی شدت سے کراہنے اور رونے لگتی ہے۔ اسی شدت کے ساتھ پیٹ میں بھی درد ہوتا ہے جہاں سے یہ اپنی جگہ تبدیل کرتا رہتا ہے۔ ماہواری کے ساتھ الٹی اور دست ہوتے ہیں۔ اس کے علاوہ مریضہ کی زبان بالکل سوکھی ہوئی ہوتی ہے مگر اسے پیاس نہیں لگتی جو اس دوا کی سب سے بڑی خصوصیت ہے۔ ماہواری کے ساتھ مریضہ کو ٹھنڈک کا بھی احساس ہوتا ہے۔ ایسی مریضہ دیکھنے میں حسین و جمیل ہوتی ہے اس کا رنگ گورا ہوتا ہے۔ اسے کھلی ہوا بے حد پسند ہوتی ہے۔ ماہواری کے ختم ہونے کے بعد بھی دست کا سلسلہ جاری رہتا ہے۔ اس دوا کو 30، 200 اور 1 M میں استعمال کریں۔

وائی برنم اوپیولس (VIBURNUM OPULUS)

پیٹ میں مروڑ کے ساتھ ماہواری ہوتی ہے۔ ماہواری ہمیشہ کافی دیر سے ہوتی ہے جو چند ہی گھنٹے رہنے کے بعد بند ہو جاتی ہے۔ درد پیڑوں سے پھیل کر دونوں جاگھووں تک ہوتا رہتا ہے۔ پیڑوں کے نیچے اور کمر تک درد ہونے لگتا ہے۔ ماہواری یہ بدبودار ہوتی ہے۔ اس دوا کو مدر ٹیچر (Q) 30، 6X اور 30 پوٹینسی میں استعمال کریں۔

دبی ہوئی ماہواری کے ہومیو پیتھک معالجات
(HOMOEOPATHIC THERAPEUTICS OF
SUPPERESSED MENSES)

ایکونائی ٹم نیپلیس (ACONITUM NAPELLUS)

اکثر یہ دیکھا گیا ہے کہ بالغ لڑکیوں میں ڈر، خوف یا سردی میں ماہواری کے وقت نکلنے سے ماہواری دب جاتی ہے۔ ان عورتوں میں جن میں افراط دم بہت زیادہ ہوتی ہے، ماہواری کے دبنے کی بیماری پائی جاتی ہے ٹھنڈے پانی میں نہانے سے بھی ماہواری دب جاتی ہے۔ اگر مریضہ کے دماغ کے خون کی نلیوں میں خون کا دباؤ زیادہ ہو جائے تو اس کے اثر سے بھی ماہواری رک سکتی ہے۔ بعض مریضوں میں یہ بھی دیکھا گیا ہے کہ سینے میں خون کی گردش بہت زیادہ ہو جانے سے ماہواری دب جاتی ہے 30 اور 200 کی پوٹینسی میں استعمال کریں۔

برائیونیا ایلبا (BRYONIA ALBA)

جب ماہواری کا وقت ہوتا ہے تو اس وقت ماہواری نہیں ہوتی بلکہ اس کے بجائے ناک سے خون گرتا ہے جسے طب کی اصطلاح میں اسے ویکریس مینسٹرویشن (VICARIOUS MENSTRUATION) کہتے ہیں۔ ایسی مریضہ کے جوڑوں میں بھی درد ہوتا ہے 30 اور 200 کے پوٹینسی میں استعمال کریں۔

کیل کیرا کاربونیکا (CALCAREA CARBONICA)

پانی میں کام کرنے سے ماہواری دب جاتی ہے یا پھر ماہواری کے وقت پانی میں بھیگ جانے سے ماہواری دب جاتی ہے۔ اکثر ان مریضوں میں یہ واقعہ رونما ہوتا ہے جو موٹی ہوتی ہیں اور جنہیں انڈا کھانے کی رغبت ہوتی ہے۔ اور ساتھ ہی ساتھ بہت جلد سردی لگنے کی کیفیت ہوتی ہے۔ اسے 200 اور 1 M پوٹینسی میں استعمال کریں۔

کیموملا (CHAMOMILLA)

اگر ماہواری کا وقت بالکل عنقریب ہو اور اسی وقت مریضہ کسی بھی وجہ کر یا کسی بات پر بہت زیادہ غصے کا اظہار کرتی ہیں تو اس کے اثر سے ماہواری دب جاتی ہے۔ ایسی مریضہ میں چڑچڑاہٹ، بے چینی اور غصہ حد درجہ پایا جاتا ہے یہ اپنی مخالفت ذرا بھی برداشت نہیں کر سکتی۔ اسے 200 پوٹینسی میں استعمال کریں۔

گرافٹس (GRAPHITES)

ماہواری کے وقت مریضہ کے پاؤں بھیگ جانے سے ماہواری رک جاتی ہے۔ یہ بیماری ان خواتین میں پائی جاتی ہے جو بہت زیادہ موٹی ہوتی ہیں اور جن کا رنگ صاف ہوتا ہے اور جن میں جلد کی بیماری اکثر بیشتر ہوا کرتی ہے اور جو سردی برداشت نہیں کر پاتیں۔ اسے 30 اور 200 پوٹینسی میں استعمال کریں۔

لیک ڈی فلورائیئم (LAC DEFLORAIUM)

ماہواری کے وقت اگر مریضہ ایک گلاس دودھ پی لے تو ماہواری دب جاتی ہے اور یہ اس وقت تک دبی رہتی ہے جب تک کہ دوسرا مہینہ نہیں آجاتا۔ اس کے علاوہ اگر مریضہ نے ماہواری کے وقت اپنے ہاتھوں کو ٹھنڈے پانی میں ڈبو دیا ہو تو اس کے اثر سے بھی ماہواری رک جاتی ہے۔ اسے 30 اور 200 پوٹینسی میں استعمال کریں۔

کریں۔

پلساٹیلانگر یکینس (PULSATILLA NIGRICANS)

اکثر بالغ لڑکیوں میں یہ دیکھا گیا ہے کہ عین ماہواری کے وقت اگر وہ اپنے پاؤں کو کافی دیر تک پانی میں بھگوئے رکھتی ہیں تو اس کے اثر سے ان کی ماہواری رک جاتی ہے۔ خاص کر ان لڑکیوں میں یہ باتیں عام پائی جاتی ہیں جن کی خون کی نلیوں میں دوران خون بہت تیز ہوتا ہے جس کی وجہ سے کران کا چہرہ سرخ دکھائی دیتا ہے۔ ایسی لڑکیوں کو کھلی ہوا بہت پسند آتی ہے۔ ان کی زبان اگرچہ سوکھی ہوئی ہوتی ہے مگر انہیں پیاس نہیں لگتی۔ اسے 200 اور 1 M پوٹینسی میں استعمال کریں۔

سٹیفی سیگریا (STAPHYSAGRIA)

مریضہ کی رسوائی کی گئی ہو، اسے بہت برا بھلا کہا گیا ہو جس سے اسے غصہ تو آجائے لیکن اس نے اپنے غصے یا ناراضگی کا اظہار نہ کیا ہو بلکہ اسے سہ لیا ہو اور جب وہ تنہائی میں جائے تو اس واقعہ پر سوچ سوچ کر من ہی من میں غصہ کرتی رہے۔ ان باتوں کے اثر سے اس کی ماہواری دب جاتی ہے۔ ایسی حالت میں اسے 30 یا 200 پوٹینسی میں استعمال کریں۔

ماہواری کا نہ ہونا اور اس کے ہومیوپیتھک معالجات

(HOMOEOPATHIC THERAPEUTICS OF AMENORRHOEA)

نوٹ : ماہواری کا نہ ہونا اور ماہواری کا دب جانا دراصل ایک ہی معنی میں استعمال ہوتا ہے کیوں کہ دونوں حالتوں میں کوئی نہ کوئی وجہ ضرور ہوتی ہے؛ جس کے نتیجے میں ماہواری نہیں ہوتی یا دب کر رہ جاتی ہے لہذا اس باب میں بھی وہی دوائیں استعمال کی جاسکتی ہیں جو ماہواری کے دبنے پر بتائی گئی ہیں۔ اس باب میں کچھ اور نئی دواؤں کا ذکر کیا جا رہا ہے جو اس حالت میں مفید ثابت ہوئی ہیں۔

ایپوسائی نم کینا نینم (APOCYNUM CANNABINUM)

مریضہ کے بدن میں سوجن آجاتی ہے۔ اسی سوجن کی وجہ سے اسے ماہواری نہیں ہوتی۔ مریضہ کو پیاس کی شدت محسوس ہوتی ہے۔ اسے 6x اور 30 پوٹینسی میں استعمال کریں۔

کولو ستھس (COLOCYNTHIS)

غصہ سے اور چپ چاپ غم سہتے رہنے سے اس کا اثر ماہواری پر پڑتا ہے جس کی وجہ سے مریضہ کو ماہواری نہیں ہوتی۔ اس کے وقت مریضہ کے پیٹ میں مروڑ

سے درد ہوتا ہے جو دا بنے سے کم ہوتا ہے یا پھر اگر وہ سامنے جھک کر بیٹھتی ہیں تو آرام ملتا ہے۔ اسے 30'6x اور 200 پوٹینسی میں استعمال کریں۔

ڈلکامارا (DULCAMARA)

سردی میں نکلنے سے یا پھر برسات کے دنوں میں پانی سے پاؤں کے بھیگ جانے کی وجہ سے ماہواری نہیں ہوتی۔ ماہواری کے وقت چہرے اور جلد پر دانے نکل آتے ہیں۔ ایسی خواتین میں یہ بھی دیکھا گیا ہے کہ ٹھنڈ کی وجہ سے یا سردی لگنے پر جلد پر دانے یا پتی اچھل آتی ہے۔ اسے 30 اور 200 پوٹینسی میں استعمال کریں۔

لیلیئم مگرینم (LILIUM TIGRINUM)

دل کی تکلیف کے ساتھ ماہواری نہیں ہوتی یا پھر بیضہ دانوں میں بیماری کی وجہ سے درد ہونے سے ماہواری نہیں ہوتی۔ اسے کو یہ احساس ہوتا ہے کہ اس کی بچہ دانی باہر کی طرف چلی آرہی ہے۔ اس کو لیکوریا کی بھی تکلیف رہتی ہے۔

سیپیا (SEPIA)

مریضہ کو بار بار دورے کی طرح سر میں درد ہوتا ہے۔ دانت میں بھی درد کا احساس ہوتا ہے۔ مریضہ کے چہرے پر ہلکے داغ ہوتے ہیں یا پھر اس کا چہرہ زرد دکھائی پڑتا ہے۔ معدہ میں درد محسوس ہوتا ہے گویا معدہ بالکل خالی ہو۔ ایسی عورت کے کولھے کا حصہ مردوں جیسا ہوتا ہے۔ اسے لیکوریا کی بھی تکلیف رہتی ہے۔ اسے 30 اور 200 پوٹینسی میں استعمال کریں۔

عورتوں میں دھات گرنے کی بیماری یا اختناق الرحم کے ہومیو پیتھک معالجات

(HOMOEOPATHIC THERAPEUTICS OF
LEUCORRHOEA)

ایسکیولس ہپو کیسٹینم (AESCULUS HIPPOCASTANUM)

دھات کا رنگ گہرا پیلا، گاڑھا اور لیدار ہوتا ہے۔ مریضہ کی کمر اور کولے
میں کافی درد ہوتا ہے۔ پاؤں میں کھینچاؤ ہوتا ہے اور وہ کافی تھکاوٹ محسوس کرتی ہے
یہاں تک کہ تھوڑی دور چلنے کے بعد تھک جاتی ہے اور پیٹھ میں کمزوری محسوس کرتی
ہے۔ ایسی عورت کو بوائسیر کی بھی بیماری ہوتی ہے۔ مہ باہر کی طرف نکلا ہوا رہتا ہے۔
اسے 6، 30 اور 200 پوٹینسی میں استعمال کریں۔

ایلو مینا (ALUMINA)

اس کے اخراج کا رنگ پیلا ہوتا ہے جو بہت زیادہ مقدار میں نکلتا رہتا ہے۔
بہتے بہتے یہ پاؤں تک چلا آتا ہے۔ بعض مریضوں میں اس کا رنگ سفید اور لیدار
ہوتا ہے۔ دن کے وقت زیادہ بہتا ہے۔ چلنے پر اور کھڑے رہنے سے بھی بڑھتا ہے۔

ٹھنڈے پانی سے غسل کرنے سے اس کے اخراج میں کمی آتی ہے۔ ماہواری سے پہلے یا ماہواری کے بعد اس کا اخراج ہوتا ہے۔ ایسی مریضہ کو قبض کی بھی شکایت ہوتی ہے۔ دو تین دن تک پاخانے کا احساس ہی نہیں ہوتا۔ اسے آلوپنڈ نہیں ہوتا۔ اس دوا کو 30 اور 200 پوٹینسی میں استعمال کریں۔

بوریکس (BORAX)

لیکوریا کافی مقدار میں ہوتا ہے جو دیکھنے میں اشارچ یعنی انڈے کی سفیدی جیسا ہوتا ہے اور کافی گرم ہوتا ہے گویا ایسا معلوم ہوتا ہے کہ گرم پانی بہہ رہا ہو۔ یہ کافی تلخ ہوتا ہے اس لئے جس جگہ پر گرتا ہے وہاں خارش ہوتی ہے۔ یہ کافی دنوں تک گرتا ہے بعض خواتین میں دو دو ہفتے تک گرتا رہتا ہے۔ اسے 30 اور 200 پوٹینسی میں استعمال کریں۔

کیل کیریا کاربونیکا (CALCAREA CARBONICA)

لیکوریا بالکل دودھ جیسا سفید رنگ کا ہوتا ہے اور بہت تلخ ہوتا ہے اس لئے جس جگہ تک یہ بہہ کر جاتا ہے وہاں خارش ہوتی ہے۔ کم عمر کی بچیوں میں اگر لیکوریا ہو تو یہ اور کارآمد ثابت ہوتی ہے۔ اس قسم کی بچیاں کافی فریہ اور موٹی ہوتی ہیں اور انڈے کی بہت شوقین ہوتی ہیں۔ انہیں سردی برداشت نہیں ہوتی۔ بہت جلد ٹونسل اور گلٹیوں کی بیماری میں مبتلا ہو جاتی ہیں۔ قبض کی بھی شکایت رہتی ہے۔ اسے 30 اور 200 پوٹینسی میں استعمال کریں۔

گرافائٹس (GRAPHITES)

ماہواری سے پہلے اور ماہواری کے بعد لیکوریا خارج ہوتا ہے۔ یہ بہت ہی تلخ ہوتا ہے۔ کافی مقدار میں دن رات بہتا رہتا ہے جو سفید رنگ کا ہوتا ہے ایسی مریضہ

میں موٹاپے کا رجحان ہوتا ہے جو سردی سے بہت جلد متاثر ہوتی ہے۔ چلنے پر اور بیٹھنے میں انہیں کمر میں بہت کمزوری محسوس ہوتی ہے۔ اس دوا کو 200 اور 1 M پوٹینسی میں استعمال کریں۔

کالی بائی کرو میکم (KALIBICHROMICUM)

لیکوریا پیلا اور ڈوری جیسا ہوتا ہے یعنی گرتے گرتے لمبے دھاگے کی شکل اختیار کر لیتا ہے۔ کمر میں کافی درد اور کمزوری کا احساس ہوتا ہے۔ ایسی مریضہ کو وقت سے بہت پہلے ماہواری شروع ہو جاتی ہے۔ شرم گاہ کے حصے میں کافی کھجلاہٹ ہوتی ہے۔ گرمی کے موسم میں اسے کافی تکلیف ہوتی ہے۔ اسے سر میں درد کے ساتھ چکر بھی آتا ہے۔ اس دوا کو 30 اور 200 پوٹینسی میں استعمال کریں۔

کریوزوٹم (KREOSOTUM)

ماہواری سے قبل اور اس کے بعد لیکوریا گرتا ہے جو بہت ہی تلخ، بدبودار اور تیزابیت والا ہوتا ہے اور جس کا رنگ پیلا ہوتا ہے، جن جگہوں میں گرتا ہے جسم کے وہ حصے کھس کر لال ہو جاتے ہیں اور دکھنے لگتے ہیں۔ کپڑے کا رنگ پیلا ہو جاتا ہے اور اس جگہ سختی آ جاتی ہے۔ ایسی عورت میں ماہواری وقت سے پہلے شروع ہوتی ہے، کافی دنوں تک جاری رہتی ہے اور کافی مقدار میں بہتی رہتی ہے۔ اسے سردی برداشت نہیں ہوتی۔ اس دوا کو 6، 30 اور 200 پوٹینسی میں استعمال کریں۔

پیلے ٹیلائنگر یکینس (PULSATILLA NIGRICANS)

لیکوریا بالکل دودھ جیسا ہوتا ہے۔ لیکوریا کے ساتھ پیٹ میں درد بھی ہوتا ہے۔ لیکوریا میں خارج ہونے والا مادہ تلخ ہوتا ہے جس سے جلن محسوس ہوتی ہے۔ مریضہ کی زبان کے اوپر زرد تہہ جی ہوتی ہے۔ اور بالکل سوکھی ہوئی ہوتی ہے مگر اسے

پلاس نہیں لگتی۔ شام کے بعد سے لیکوریا کا اخراج بڑھنے لگتا ہے۔ کھلی ہوا اسے کو بے حد پسند ہوتی ہے۔ اس دوا کو 30 اور 200 پوٹینسی میں استعمال کریں۔

سیپیا (SEPIA)

لیکوریا کا رنگ یا تو پیلا ہوتا ہے یا پھر سبز رنگ کا ہوتا ہے۔ اس میں کافی خارش ہوتی ہے کیوں کہ یہ بہت تلخ آمیز ہوتا ہے۔ مریضوں میں لیکوریا سفید یا بالکل دودھ جیسا بھی ہوتا ہے۔ اس کو یہ احساس ہوتا ہے کہ جیسے پیٹ کے تمام اعضاء اندام نہانی کے راستے سے باہر کی طرف نکل رہے ہوں۔ اسی لئے وہ ہمیشہ ایک پاؤں کو دوسرے پاؤں کے اوپر چڑھا کر بیٹھتی ہے تاکہ وہ اعضاء باہر نکلنے نہ پائیں۔ اس دوا کو 30 اور 200 پوٹینسی میں استعمال کریں۔

سلفر (SULPHUR)

درد اور جلن کے ساتھ لیکوریا خارج ہوتا ہے، جس سے شرم گاہ میں کافی درد بھی ہوتا ہے۔ لیکوریا پتلا اور زردی مائل رنگ کا ہوتا ہے۔ لیکوریا سے پیڑوں کے حصے میں چھن جیسا درد ہوتا ہے اور اندام نہانی میں جلن ہوتی ہے جس سے کافی خارش بھی ہوتی ہے۔ لیکوریا دن کے وقت گرتا رہتا ہے۔ ایسی عورت کے سر کے اوپری حصہ میں کافی گرمی کا احساس ہوتا ہے اور ہتھیلی اور پاؤں کے تلوؤں میں بھی جلن ہوتی ہے جس پر پانی رکھنے سے اچھا معلوم ہوتا ہے۔ اس دوا کو 200 اور 1 M پوٹینسی میں استعمال کریں۔

سیفی لینم (SYPHILINUM)

لیکوریا کافی بدبودار اور پیلے رنگ کا ہوتا ہے۔ یہ کافی مقدار میں خارج ہوتا رہتا ہے۔ لیکوریا کے ساتھ کمر میں درد بھی ہوتا ہے۔ رات سے لے کر صبح صادق

تک لیکوریا کا اخراج بندھ جاتا ہے۔ اس کے پیچھے سفل کا سبب ہوتا ہے۔ مریضہ کی یادداشت بالکل کمزور ہو جاتی ہے۔ حتیٰ کہ نام اور تاریخ تک یاد نہیں رہتی۔ اسے 200 پوٹسی میں استعمال کریں۔

حد سے زیادہ ماہواری کے ہومیوپیتھک معالجات

(HOMOEOPATHIC THERAPEUTICS OF MENORRHAGIA)

ایمونیم کاربونیکم (AMMONIUM CARBONICUM)

وقت سے پہلے ماہواری شروع ہوتی ہے اور کافی مقدار میں درد کے ساتھ اخراج ہوتا ہے۔ خون کا رنگ کالا اور جما ہوا ہوتا ہے۔ مریضہ کی جاتکھوں میں بھی درد کا احساس ہوتا ہے۔ اکثر یہ دیکھا گیا ہے کہ اس قسم کی مریضہ کی ناک بند ہوتی محسوس ہوتی ہے۔ اسی لئے ناک کے سوکھے پن کا دور کرنے کے لئے ناک میں سونگھنے والی دوا کا استعمال کرتی ہے۔ جب وہ صبح کے وقت منہ دھوتی ہے تو اس کی ناک سے خون گرتا ہے۔ اس دوا کو 6' 30 اور 200 پوٹینسی میں استعمال کریں۔

بیلادونا (BELLADONNA)

وقت سے پہلے اور کافی مقدار میں خون خارج ہوتا ہے اور کافی دنوں تک خون گرتا رہتا ہے۔ خون کا رنگ بالکل سرخ ہوتا ہے اور مریضہ کو گرمی کا احساس ہوتا ہے۔ اسے یہ احساس ہوتا ہے کہ گویا پیٹ کے اعضاء باہر کی طرف نکل کر آرہے ہوں۔ سر میں دھب دھبائٹ کے ساتھ درد ہوتا ہے ایسا معلوم ہوتا ہے کہ جیسے سر

بالکل پھٹا جا رہا ہو۔ متلی اور گشتی کی وجہ سے مریضہ بیٹھ نہیں پاتی ہے۔ پیڑوں میں کافی درد بھی ہوتا ہے۔ اسے 6x '30 اور 200 پوٹینسی میں استعمال کریں۔

کیل کیرا کاربونیکا (CALCAREA CARBONICA)

وقت سے پہلے 'حد سے زیادہ اور کافی دنوں تک ماہواری ہوتی رہتی ہے۔
ماہواری سے پہلے پیٹ میں درد 'سر میں درد' چھاتیوں میں بھاری پن کا احساس ہوتا ہے 'ماہواری کے دوران مریضہ کو یہ محسوس ہوتا ہے کہ جیسے اس نے اپنے پاؤں میں بھگیے ہوئے موزے پہن رکھے ہوں۔ سرد آب و ہوا سے بہت جلد متاثر ہوتی ہے اور انڈے کی بڑی شوقین ہوتی ہے۔

کروکس سیٹیوس (CROCUS SATIVUS)

ماہواری ٹھیک وقت پر ہوتی ہے لیکن کافی مقدار میں اور کافی دنوں تک جاری رہتی ہے۔ خون کا رنگ کالا 'جما ہوا اور دھاگے کی مانند ہوتا ہے۔ ذرا سی حرکت ہونے سے اس کے اخراج میں تیزی آجاتی ہے۔ مریضہ کو ایک عجیب و غریب قسم کا احساس ہوتا ہے کہ جیسے اس کے پیٹ میں کوئی چیز حرکت کر رہی ہو۔ اسے سیڑھی کے اوپر چڑھنے سے دھڑکن اور کمزوری محسوس ہوتی ہے۔ مریضہ کی داہنی چھاتی میں ایسا محسوس ہوتا ہے کہ جیسے کوئی زندہ چیز حرکت کر رہی ہو۔ اس دوا کو 6x اور 30 میں استعمال کریں۔

کریوزوٹم (KREOSOTUM)

ماہواری وقت سے پہلے اور کافی مقدار میں رک رک کر ہوتی رہتی ہے۔ مریضہ کو اس بات کا احساس ہوتا ہے کہ اب وہ ماہواری سے آزاد ہو گئی ہے مگر کچھ ہی گھنٹوں یا پھر دوسرے دن دوبارہ پھر شروع ہو جاتی ہے۔ خون کا رنگ کالا ہوتا ہے

اور کافی بدبودار ہوتا ہے۔ اس کے علاوہ جسم کے جس حصے میں گرتا ہے وہاں خارش ہونے لگتی ہے گویا اس میں تیزابیت بہت زیادہ ہوتی ہے۔ اگر فراغت حیض عورتوں میں یہ کیفیت پائی جاتی ہو تو یہ دوا بھی استعمال کی جاسکتی ہے۔ اس دوا کو 30 '6 اور 200 پوٹینسی میں استعمال کریں۔

فاسفورس (PHOSPHORUS)

ماہواری وقت سے قبل، حد سے زیادہ اور کافی دنوں تک جاری رہتی ہے۔ کمزوری کے ساتھ پاؤں میں ٹھنڈک محسوس ہوتی ہے۔ پیٹ میں خالی پن کا احساس ہوتا ہے۔ ایسی مریضہ کو کھانے کے بعد کافی ڈکار آتے ہیں۔ دیکھنے میں اس کا رنگ صاف ہوتا ہے وہ لمبی اور دہلی پتلی ہوتی ہے۔ وہ ٹھنڈی غذا اور ٹھنڈا پانی، آئس کرم، ملائی کی برف وغیرہ کھانے کی بڑی شوقین ہوتی ہے۔ اس دوا کو 30 اور 200 پوٹینسی میں استعمال کریں۔

ڈاکٹر الاسلام علی

سبائنا (SABINA)

ماہواری اس قدر زیادہ اور ایک لمبی مدت تک ہوتی ہے کہ مریضہ بے حد کمزور ہو جاتی ہے۔ اکثر یہ دیکھا گیا ہے کہ خون آدھا رقیق اور آدھا جما ہوا ہوتا ہے۔ ماہواری کے ساتھ درد بھی ہوتا ہے جو کمر سے پیڑوں میں پھیلتا ہے۔ ایسی عورتیں جن میں مینور بیجا بار بار دیکھا جاتا ہے، حمل گر ہو جاتے ہیں۔ ایسی عورتوں کے لئے یہ ایک مفید دوا ہے۔ اسے مدر نکچر (Q) 30 '6 اور 200 پوٹینسی میں استعمال کریں۔

ٹی لیگومیدس (USTILAGO MAYDIS)

فراغت حیض میں کافی مقدار میں ماہواری ہوتی ہے یا پھر حمل ضائع ہونے کے بعد دو سے تین ہفتوں تک خون خارج ہوتا رہتا ہے۔ خون کا رنگ کالا اور جما

ہوا ہوتا ہے اور دھاگے کی شکل میں گرتا رہتا ہے۔ زچگی کے بعد اگر بہت زیادہ اور کافی دنوں تک خون بہتا رہے تو یہ دوا استعمال کی جاسکتی ہے۔ اس دوا کو مدر منچھر (Q) 30 اور 200 پٹینسی میں استعمال کریں۔

بچہ دانی سے خون کا بہنا اور ہومیو پیتھی معالجات

(HOMOEOPATHIC THERAPEUTICS OF UTERINE HAEMORRHAGE)

ایری جیرون (ERIGERON)

پیشاب کی تکلیف کے ساتھ بچہ دانی سے خون بہتا ہے جو کافی مقدار میں بالکل سرخ رنگ کا ہوتا ہے۔ ایسا احساس ہوتا ہے کہ جیسے بچہ دانی باہر کی طرف نکلی آرہی ہو۔ اس کے ساتھ بار بار پاخانے کے راستے اور پیشاب کی تھیلی میں جلن ہوتی رہتی ہے۔ ذرا سی حرکت سے خون بہنا شروع ہو جاتا ہے۔ ماہواری کے بجائے ناک سے خون گرتا ہے۔ اس دوا کو مدر نکچر (Q) اور 3X میں استعمال کریں۔

ہیما میلس ور جینیکا (HAMAMELIS VIRIGICA)

بچہ دانی سے رک رک کر خون بہتا رہتا ہے۔ اسقاط حمل اور زچگی کے بعد خون گرنے سے یہ دوا کارگر ثابت ہوتی ہے۔ خون کا رنگ کالا ہوتا ہے اور کافی مقدار میں بہتا ہے۔ پیٹ میں ہلکا ہلکا درد ہوتا ہے اکثر ماہواری کے درمیانی وقفہ میں خون گرنا شروع ہو جاتا ہے۔ آہستہ آہستہ خون بہتا ہی رہتا ہے۔ اس دوا کو مدر نکچر (Q) اور 6 پوٹینسی میں استعمال کریں۔

سیکیل کورنوٹم (SECALE CORNUTUM)

آہستہ آہستہ بچہ دانی سے خون رستا رہتا ہے۔ ایسی مریضہ بالکل ہی دلی پتلی اور ڈھانچے کی مانند دکھائی دیتی ہیں۔ خون کا رنگ کالا ہوتا ہے۔ آہستہ آہستہ پانی کی شکل میں دوسری ماہواری تک خون بہتا رہتا ہے لیکن پیٹ میں درد بہت ہی معمولی سی جلن کے ساتھ ہوتا ہے۔ اگرچہ ایسی مریضہ کا پورا بدن ٹھنڈا ہو جاتا ہے لیکن پھر بھی کپڑے ڈھکے رکھنا پسند نہیں کرتیں اور ٹھنڈک سے اس کے برعکس آرام ہی ملتا ہے۔ اسے 30 اور 200 پوٹینسی میں استعمال کریں۔

تھیلیسی برسا پیسٹورس (THLASPI BURSA PASTORIS)

کافی مقدار میں اور بار بار ماہواری ہوتی ہے۔ بچہ دانی میں کافی شدت کے ساتھ درد بھی ہوتا ہے۔ ہر دوسرے ماہ ماہواری حد سے زیادہ ہوتی ہے خون کا رنگ کالا اور بدبودار ہوتا ہے۔ کپڑے پر لگے دھبے بہت مشکل سے دھل پاتے ہیں۔ اس قدر ماہواری ہوتی ہے کہ دوسرا مہینہ قریب آ جاتا ہے۔ ایسی مریضہ لیکوریا کی تکلیف سے بھی پریشان رہتی ہے۔ اس دوا کو مدر ٹنگر (Q) 3X اور 3X پوٹینسی میں استعمال کریں

ٹرلیم پینڈولیم (TRILLIUM PENDULUM)

فراخت حیض میں اگر بچہ دانی سے خون بہتا ہے تو ایسی حالت میں یہ دوا بہت ہی کارگر ہوتی ہے۔ مریضہ کو ایسا احساس ہوتا ہے کہ جیسے کمر سے اس کے کولھے کٹ کر گر رہے ہوں۔ اسی لئے وہ کمر کے حصے کے کپڑے کو زور سے یعنی کس کر باندھے رکھتی ہے۔ خون کا رنگ بالکل سرخ ہوتا ہے جو چلنے پھرنے سے بہت تیزی کے ساتھ بہتا ہے۔ اسے مدر ٹنگر اور 3X میں استعمال کریں۔

نوٹ : مندرجہ بالا دواؤں کے علاوہ میوزر جیما میں بیان کی گئی دوائیں بھی میٹرو جیما کے مریضوں کے لئے استعمال کی جاسکتی ہیں۔

بچہ دانی کے ٹیومر کے ہومیوپیتھک معالجات

(HOMOEOPATHIC THERAPEUTICS OF
UTERINE TUMOUR)

اورم میوریا ٹیکم میٹرونیٹم

(AURUM MURIATICUM MATRONATUM)

یہ دوا بچہ دانی کے ٹیومر کے لئے بہت کار آمد سمجھتی جاتی ہے۔ ڈاکٹر برنیٹ کے مطابق جتنی افادیت اس مرض کے مریضوں کے لئے اس دوا میں پائی جاتی ہے دوسری کسی دوا میں نہیں پائی جاتی۔ ٹیومر کافی بڑے سائز کا ہوتا ہے کہ پیڑ کا نچلا حصہ بچہ دانی سے بھر جاتا ہے۔ ایسی عورت میں ہائی بلڈ پریشر بھی ہوتا ہے اور اس کی بیضہ دانیاں بہت سخت ہو جاتی ہیں۔ ٹیومر کی وجہ سے بچہ دانی بھی بہت سخت ہو جاتی ہے۔ اس دوا کو 3 x (ٹرائی چوریشن) 6 اور 30 پوٹینسی میں استعمال کریں۔

کیل کیرا آیوڈاٹا (CALCAREA IODATA)

ایسی مریضہ مونی ہوتی ہے، اور سردی سے بہت جلد متاثر ہوتی ہے جس کا نتیجہ یہ ہوتا ہے کہ گلٹیاں ابھر آتی ہیں۔ بعض مریضوں میں یہ بھی دیکھا جاتا ہے کہ سن بلوفیت میں ان کے گلے کی گلٹیاں اور تھائی رائیڈ گلینڈ بھی بڑھ جاتے ہیں۔ بچہ دانی کے ٹیومر چھوٹے بھی ہوتے ہیں اور بڑے بھی۔ اگر یہ کھلی اور سرد ہوا میں سواری کرتی ہیں تو ان کے سر میں درد ہونے لگتا ہے۔ سردی کے ساتھ ساتھ انہیں

چھینکیں بھی آنے لگتی ہیں۔ اس دوا کو 2 x اور 3 x (ٹرائی چوریشن) اور 6'30 اور 200 پوٹینسی میں استعمال کریں۔

کاری نوسن (CARCINOSIN)

یہ ایک ایسی دوا ہے جو بچہ دانی کے ٹیو مر میں استعمال کی جاتی ہے۔ اگر کسی مریضہ کے خاندان میں کینسر کی ہسٹری ملتی ہو یا خود مریضہ میں کینسر جیسے مہلک مرض کی علامتیں یا رجحان پایا جاتا ہو تو اس عورت کے لئے یہ دوا بڑی مفید ثابت ہوتی ہے۔ کینسر کی وجہ سے بچہ دانی میں ہونے والے تکلیف دہ درد کو کم کرنے اور مریضہ کو آرام پہنچانے کے لئے یہ دوا اکثر استعمال کی جاتی ہے۔ ایسی مریضہ کی بچہ دانی سے خون بھی بہتا رہتا ہے اور پیشاب میں کافی جلن ہوتی ہے اور پیشاب کافی رک رک کر آتا ہے۔ مریضہ کو نیند نہیں آتی اور نہ ہی بھوک لگتی ہے۔ ایسی عورت نفاست پسند ہوتی ہے اور بعض خواتین کی چھاتیاں بڑی اور سخت ہو جاتی ہیں۔ اس کے علاوہ جسم کے دوسرے حصے کی گلیٹیاں بھی ابھر آتی ہیں۔ اس دوا کو 30 اور 200 کی پوٹینسی میں استعمال کریں لیکن بار بار دہرانے سے پرہیز کریں۔

کونیم میکولیٹم (CONIUM MACULATUM)

یہ دوا غیر شادی شدہ عورتوں، بیواؤں اور جنسی خواہشات کو دبا کر رکھنے والی عورتوں کے لئے مفید ثابت ہوتی ہے۔ اگر ایسی عورتوں میں بچہ دانی کے ٹیو مر ہوتے ہیں تو یہ دوا انہیں شفا بخشے میں مدد کر سکتی ہے۔ اگرچہ شفا بخشے کا کام اللہ کے ہاتھوں ہے، اس کی مرضی کے بغیر تو ایک پتہ بھی نہیں مل سکتا۔ ایسی عورت کی ہسٹری لینے پر پتہ چلتا ہے کہ ماہواری کے وقت اس کے چہرے پر دانے نکل آتے ہیں اور اس کی چھاتیاں بھاری ہو جاتی ہیں جو ماہواری کے ختم ہوتے ہی یہ علامات غائب ہو جاتی ہیں۔ اسے چکر بھی آتا ہے حتیٰ کہ سر گھمانے پر سر چکراتا ہے۔ اس دوا کو 30'200 اور

1 M پوٹیشی میں استعمال کریں۔

فریکسی نس ایمریکانا (FRAXINUS AMERICANA)
ٹیومر کی وجہ سے بچہ دانی بڑی ہو جاتی ہے اور باہر کی طرف آنے لگتی ہے
جس کا احساس مریضہ کو ہوتا ہے کہ جیسے کوئی بھاری چیز باہر کی طرف نکل کر آرہی ہو۔
اس کے علاوہ دوپہر اور رات کے وقت مریضہ کے پیروں میں اکڑن ہوتی رہتی ہے۔
ماہواری کے وقت شدت کا درد ہوتا ہے۔ اس کے علاوہ اسے لیکوریا کی بھی شکایت
ابھی ہے۔ ایسی مریضہ افسردہ پریشان اور بے چین رہتی ہے۔ اس دوا کو مدر منچر اور X
3 پوٹیشی میں استعمال کریں۔

کالی آیوڈیٹم (KALI IODATUM)
ایسی مریضہ میں بچہ دانی میں ٹیومر کے علاوہ پرانی سردی اور بار بار چھینکوں
کی بھی علامتیں پائی جاتی ہیں۔ سردی اس قدر پریشان کن ہوتی ہے کہ ناک صاف
کرتے کرتے اس میں جلن سی محسوس ہوتی ہے اور اس کے ساتھ ہی پیشانی کے حصے
میں سائٹو سائیٹس کا درد بھی ہوتا ہے۔ جسم کی گلٹیاں خاص کر گلے میں پائی جانے
والی گلٹیاں ابھر آتی ہیں۔ ایسی عورت کو کھلی ہوا راس آتی ہے۔ اس دوا کو 30 اور
200 پوٹیشی میں استعمال کریں۔

لیپس ایلبس (LAPIS ALBUS)
ٹیومر کے علاوہ بچہ دانی میں ناقابل برداشت جلن کے ساتھ درد ہوتا ہے اور
اس سے کافی مقدار میں خون بہتا ہے۔ ایسی مریضہ کو بار بار بھوک لگتی ہے اور اس کی
چھاتیوں میں بھی ٹیومر ہو جاتا ہے۔ گردن کے دونوں طرف گلٹیاں ابھر آتی ہیں یہ دوا
بچہ دانی کے کینسر میں بھی استعمال کی جاتی ہے۔ اس دوا کو 2 X، 3 X اور 6 X پوٹیشی
میں استعمال کریں۔

تھوجا آکسی ڈینالس (THUJA OCCIDENTALIS)

ایسی عورت کی بچہ دانی میں ٹومر کے علاوہ اس کی باتیں بیضہ دانی میں کافی درد ہوتا ہے جو ماہواری کے وقت کافی بڑھ جاتا ہے۔ اس میں ماہواری کم اور رک رک کر آتی ہے۔ اس کے علاوہ اس میں سبز رنگ کا لیکوریا بھی ہوتا ہے۔ اگر ایسی مریضہ میں ٹیکا لگانے کی ہسٹری پائی جائے تو اور بھی بہتر ہے۔ اس کے ذہن میں ہر وقت یہی چھایا رہتا ہے کہ جیسے اس کے بغل میں کوئی کھڑا ہوا ہے یا پھر اس کے پیٹ میں کوئی زندہ شے حرکت کر رہی ہے۔ اسے گوشت اور چائے بہت پسند ہیں لیکن سبزیاں کھانا نہیں چاہئیں۔ اس دوا کو 200 اور 1 M پوٹینسی میں استعمال کریں۔

اسقاط حمل کے ہومیوپیتھک معالجات (HOMOEOPATHICS THERAPEUTIC OF ABORTION OR MISCARRIAGE)

ایکونائی ٹم نیپلس (ACONITUM NAPELLUS)

دوران حمل اگر کسی عورت کے ساتھ کوئی ایسا واقعہ پیش آجائے جس سے اس کے دل و دماغ پر خوف و ہراس طاری ہو جائے اور اس کا اثر باقی رہے تو حمل کا اسقاط ہو جاتا ہے اور خون بنے لگتا ہے اسے موت سے اس قدر ڈر ہونے لگتا ہے کہ وہ موت کا دن حتیٰ کہ وقت بھی بتاتی ہے اور کہتی ہے کہ اب وہ نہیں بچ پائے گی۔ ذہن میں ہر وقت پریشانی اور الجھن رہتی ہے۔ ذرا ذرا سی بات پر گھبرا جاتی ہے۔ سو کر اٹھنے سے سر میں چکر سا آتا ہے۔ اس دوا کو 30، 200 اور 1 M پوٹینسی میں استعمال کریں۔ ایمر جنسی کی حالت میں یہ دور وقفہ پر دہرائی جاسکتی ہے۔

ایکٹیارسی موسا (ACTAEA RACEMOSA)

اکثر یہ دیکھا گیا ہے کہ بہت سی عورتیں مایوسی کے ساتھ آکر کہتی ہیں کہ ڈاکٹر صاحب جب حمل تیسرے مہینے کا ہوتا ہے تو ضائع ہو جاتا ہے۔ ایسی عورتوں میں ایسے واقعات حتیٰ کہ پانچ پانچ بار ہو جاتے ہیں۔ ایسی حالت میں یہ دوا بہت کارگر ثابت ہوتی ہے۔ کچھ عورتیں ایسی دیکھی جاتی ہیں جو حاملہ تو ضرور ہوتی ہیں مگر بچہ مردہ پیدا ہوتا ہے۔ ایسی حالت میں بھی اگر یہ دوا استعمال کی جائے تو انشاء اللہ! مایوسی کا سامنا

نہیں کرنا پڑے گا اور عورت ماں بننے کے قابل ہو جائے گی۔ اس دوا کے استعمال سے زچگی کے وقت کی تکلیفیں بھی کم ہو جاتی ہیں اور کم مدت میں بچے کا جنم بھی ہو جاتا ہے۔ اس دوا کو سی سی فوگاریسی موسا بھی کہا جاتا ہے۔ اسے $1 \times$ '3 \times '6 اور 30 پوٹینسی میں استعمال کریں۔

ایلیٹریس فیری نوسا (ALETRIS FARINOSA)

ایسی حاملہ عورتیں بہت ہی کمزور ہوتی ہیں اور ہر وقت تھکی تھکی سی ہوتی ہیں ان میں خون کی بھی کمی ہوتی ہے۔ جب بھی حاملہ ہوتی ہیں حمل ضائع ہو جاتا ہے۔ کافی مقدار میں خود گر جاتا ہے اور حمل کے وقت ان کے عضلات (مسل) میں درد ہوتا ہے۔ اسے در ٹیچر $1 \times$ '2 \times اور 3 \times پوٹینسی میں استعمال کریں۔

آرنیکا مونٹانا (ARNICA MONTANA)

گرنے کے بعد حمل کے گرنے کا خطرہ لاحق ہو جائے تو یہ دوا مفید ثابت ہو سکتی ہے۔ حاملہ عورت کو یہ احساس ہوتا ہے کہ جیسے بچہ آڑی یعنی ترچھے پوزیشن میں ہو گیا ہو۔ گرنے کے بعد خون بھی جاری ہو جاتا ہے۔ اگر فوراً اس دوا کو استعمال کی گئی تو حمل کو ضائع ہونے سے بچایا جاسکتا ہے۔ اسے 6 اور 30 پوٹینسی میں استعمال کریں۔

بیپٹسیا ٹنکٹوریا (BAPTISA TINCTORIA)

گھریلو حالات کی وجہ سے ذہنی افسردگی یا ذہنی دباؤ اور صدمے کی وجہ سے حاملہ عورت کو حمل کے ضائع ہونے کا خطرہ لاحق ہو جاتا ہے۔ بعض دفعہ تو یہ بھی دیکھا جاتا ہے حمل کے دوران اگر بخار آ جاتا ہے تو کم بخار میں بھی حمل کے نقصان ہونے کا خدشہ ہو جاتا ہے حالانکہ ایسا سانحہ بہت کم خواتین کے ساتھ رونما ہوتا ہے اور

وہ بھی ٹائیغائیڈ بخار کے ہونے سے اس دوا کو مدر ٹکچر 3x '3 اور 30 '6 اور 200 پوٹینسی میں استعمال کریں۔

کالوفائی لم (CAULOPHYLLUM)

یہ ایسی دوا ہے جو حمل کو ضائع ہونے سے روکتی ہے اگر کسی عورت کا بار بار حمل گر جاتا ہو تو یہ دوا کارگر ثابت ہو سکتی ہے۔ ایسی عورتوں میں بچہ دانی کی کمزوری سے حمل ضائع ہو جاتا ہے۔ آہستہ آہستہ اور معمولی مقدار میں خون بہتا رہتا ہے جس کی وجہ سے پیٹ میں شدت کا درد ہوتا ہے جو ناقابل برداشت ہوتا ہے، یہ درد پیٹ سے جانگھ، سینہ اور پیٹھ حتیٰ کہ جسم کے پورے حصے میں پھیل جاتا ہے۔ اس دوا کو مدر ٹکچر 3x '3 اور 30 '6 اور 200 پوٹینسی میں استعمال کریں۔

سنامونم (CINNAMONUM)

چلتے چلتے پاؤں پھسل جانے یا غلط قدم پڑ جانے یا بھاری سامان اٹھانے یا پھر پیڑو کے حصے میں تباؤ یا دباؤ پڑنے سے بھی حمل کو خطرہ لاحق ہو جاتا ہے اور اس طرح حمل ضائع ہو جاتا ہے۔ اس حادثہ کے بعد ہی کافی مقدار میں بالکل سرخ خون گرنے لگتا ہے۔ ناک میں کھجلاہٹ ہونے لگتی ہے اور بے حد بے چینی محسوس ہوتی ہے حتیٰ کہ نیند میں بھی پریشانی و بے چینی رہتی ہے۔ مریضہ کبھی دائیں کروٹ تو کبھی بائیں کروٹ بدلتی رہتی ہے۔ اس دوا کو مدر ٹکچر 3x '3 اور 6x '6 پوٹینسی میں استعمال کریں۔

اگنیشیا (IGNATIA)

اگر کسی حاملہ عورت کو ذہنی صدمہ پہنچتا رہے اور وہ اس صدمے کو دبائے رکھتی ہو تو اس کا اثر حمل پر پڑ سکتا ہے، جس کے نتیجے میں حمل کا نقصان ہو سکتا ہے۔ ایسی عورتیں تنہائی میں کراہتی رہتی ہیں اور دکھ کا اظہار نہیں کرتیں۔ ان کے معدے

میں خالی پن کا احساس بھی ہوتا ہے۔ پیٹ میں مروڑ شروع ہو جاتا ہے اور پھر حمل ضائع ہو جاتا ہے کالا کالا خون گرنا شروع ہو جاتا ہے۔ اس دوا کو 30، 200 اور 1 M پوٹینسی میں استعمال کریں۔

سیبائی نا (SABINA)

جن عورتوں میں حمل کے پہلے تین مہینوں کے دوران حمل ضائع ہوتے ہیں ان عورتوں کے لئے ایک یہ مفید دوا ہے۔ خاص کر ان عورتوں کے لئے یہ بے حد مفید ہے جن میں پہلی ماہواری سن بلوغ سے بہت قبل شروع ہوئی ہو۔ اور حاملہ ہونے کے تیسرے مہینے میں حمل گر ہو جاتا ہو۔ تیسرے مہینے کے شروع ہونے سے ختم ہونے کے دوران اچانک سرخ رنگ کا خون بہنا شروع ہوتا ہے۔ اور پھر جما ہوا خون آنے لگتا ہے۔ یہ اخراج کافی مقدار میں ہوتا ہے۔ اس کے بعد کمر میں شدید درد ہوتا ہے۔ جو پھیل کر پیڑوں کے نچلے حصے تک آتا ہے۔ ایسا احساس ہوتا ہے کہ اس جگہ کی ہڈی ٹوٹ کر بکھر رہی ہو۔ اس دوا کو مدر ٹیگر 3x، 30 اور 200 پوٹینسی میں استعمال کریں۔

سیکیل کورنوٹم (SECALE CORNUTUM)

حمل جب تیسرے مہینے میں پہنچتا ہے تو یہ ضائع ہو جاتا ہے۔ وزنی سامان اٹھانا، سخت محنت کا کام کرنا اور پیٹ پر دباؤ پڑنا اس کے اسباب ہیں۔ اس قسم کی حاملہ عورتیں دیکھنے میں بالکل ہی دلی پتلی یعنی ڈھانچے کی مانند ہوتی ہیں۔ حادثہ کے بعد درد کے ساتھ پتلا کالا خون بہنے لگتا ہے۔ جسم کو چھوئے سے ٹھنڈک کا احساس ہوتا ہے لیکن مریضہ جسم کو ڈھکے رہنا پسند نہیں کرتی۔ اسے ایسا احساس ہوتا ہے گویا جسم کے ہر حصہ سے آگ کے شعلے نکل رہے ہوں۔ اس لئے اسے اندرونی طور پر گرمی لگتی ہے۔ اس دوا کو مدر ٹیگر 3x، 6x، 30 اور 200 میں استعمال کریں۔

والی برنم اوپیولس (VIBURNUM OPULUS)

جن عورتوں میں شروع سے ہی ماہواری کی تکلیف رہی ہو یعنی ہمیشہ مقررہ تاریخ گزرنے کے بعد ہوتی ہو اور وہ بھی چند گھنٹوں کے بعد ختم ہو جاتی ہو اور ان میں حمل ٹھہرتا نہ ہو بلکہ شروع کے مہینوں میں ہی ضائع ہو جاتا ہو تو ایسی عورتوں کے لئے یہ دوا کار آمد ثابت ہوتی ہے۔ اس دوا کے استعمال سے مستقبل میں ہونے والے حمل کو ضائع ہونے سے بچایا جاسکتا ہے۔ پیٹ میں اکڑن شروع ہو جاتی ہے اور جانکھوں تک پھیل جاتی ہے۔ جب اس قسم کی عورت جب علاج کے لئے آتی ہے تو پتہ چلتا ہے کہ ماضی میں اس کے کئی حمل اس طرح سے ضائع ہو چکے ہیں۔ ایسی مایوس عورتیں اس دوا کے استعمال سے ماں بننے کے قابل ہو جاتی ہیں۔ اس دوا کو مدر ٹنچر 3X، 6X اور 30 پوٹینسی میں استعمال کریں۔

نوٹ:- آج کل سماج میں اس قدر برائی اس قدر پھیل گئی ہے کہ جنسی بے راہ روی عام ہوتی جا رہی ہے۔ اسی جنسی بے راہ روی اور کھلی آزادی کا نتیجہ ہے کہ بہت ساری لڑکیاں ایسی ہیں جو بہکاوے میں آکر اپنے جذبات پر قابو نہیں پاتیں اور وہ شادی سے قبل ہی حاملہ ہو جاتی ہیں۔ یہ کلنگ سماج کے لئے ایک بد نما داغ سمجھا جاتا ہے جسے مٹانے کے لئے انہیں اسقاط حمل یعنی پیٹ گرانا پڑتا ہے جس کا مستقبل میں برا اثر پڑتا ہے۔ اسقاط حمل کرانے والی دوسری قسم کی وہ عورتیں ہیں جو شادی شدہ ہوتی ہیں۔ وہ اپنی فیملی کو چھوٹی اور خوشحالی رکھنے کے لئے ان چاہے حمل داش کرا دیتی ہیں۔ جس سے ان کی صحت پر برا اثر پڑتا ہے۔ ان دونوں حالات میں برے اثرات کو ذائل کرنے کے لئے ہیلونیاں ڈایوایکا (HELONIAS DIOICA) سباینا اور (SABINA) مدر ٹنچر 3X اور 30 پوٹینسی میں استعمال کریں۔

(BIBLIOGRAPHY)

کتابیات

- 1. Harrison's Principles of Internal Medicine;
International Student's Edition (6th Edition)**
- 2. The Principles and Practice of Medicine; Edited
by Sir Stanley Davidson; 7 th Edition**
- 3. Dorland's Pocket Medical Dictionary; 21st
Edition.**
- 4. Dictionary of Practical Materia Medica; by John
Henry Clarke; Vols. I, II & III**
- 5. Pocket Manual of Homoeopathic Materia
Medica; by William Boericke; 9th Edition.**
- 6. Keynotes and Characteristics with Compa-
risons by H.C. Allen.**
- 7. Clinical Gynaecology; by James C. Wood**
- 8. Text Book of Materia Medica; by Dr. S.K. Dubey**
- 9. Repertory of the Homoeopathic Materia Medica;
by Dr. J. T. Kent; 6th American Edition**
- 10. Johnson's Therapeutic Key by I. D. Johnson.**
- 11. A Clinical Repertory of the Dictionary of
Materia Medica; By J. H. Clarke.**
- 12. Text Book of Preventive and Social Medicine;
by J. E. Park and K. Park 8th Edition.**
- 13. Text book of Physiology; by Dr. C. Chatterjee**

ہماری مقبول عام ہومیوپیٹھی مطبوعات

- ۱۔ امراض نسوان (باتصویر)
 - ۲۔ سائیکلو پیڈیا آف ہومیوپیٹھک ڈرگز
 - یعنی مخزن المفردات تین ولیم دیکل سیٹ
 - ۳۔ نسخہ جات ہومیوپیٹھی
 - ۴۔ ایلن کی نوٹس کلید میٹر میڈیکا
 - ۵۔ یوکیک سائنس
 - ۶۔ میٹر یا میڈیکا مع ریپرٹری
 - ۷۔ پریکٹس آف میڈیسن
 - ۸۔ رفیق ہومیوپیٹھی (ہومیوپیٹھک علم العلاج پر ایک معرکہ الاراکتاب
 - ۹۔ لیکچرز کینٹ میٹر یا میڈیکا
 - ۱۰۔ نیش لیڈر
 - ۱۱۔ دوا کا انتخاب
 - ۱۲۔ آرگن آف میڈیسن
 - ۱۳۔ بورک میٹر یا میڈیکا ریپرٹری
 - ۱۴۔ ایلن کی نوٹس
 - ۱۵۔ بورک میٹر یا میڈیکا (۵۰ طبی اشارات)
 - ۱۶۔ خاندانی علاج
 - ۱۷۔ ریپرٹری کی ذریعاتی مرض
 - ۱۸۔ ریپرٹری نفرت و خواہشات
 - ۱۹۔ موکے
 - ۲۰۔ گلے کے غدد بڑھ جانا
 - ۲۱۔ گھر کا ڈاکٹر
- تمام ہومیوپیٹھک کتابوں کی فہرست ہم سے طلب فرمائیں۔

بی جین پبلشرز (پرائیویٹ لمیٹڈ)
1920/ مئی نمبر 10 - چونا منڈی پھار کتب خانہ لاہور 555